

*Erlangen* *1898*  
Lane Medical Library

Ueber die

# Dauererfolge der Totalexstirpation

bei Carcinoma uteri.

---

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

vorgelegt

der hohen medizinischen Fakultät

der

kgl. bayr. Friedrich-Alexanders-Universität Erlangen

von

Hermann Eller

aus Kleinfischlingen (Rheimpfalz).

---

Erlangen 1898.

Druck der Universitäts-Buchdruckerei von E. Th. Jacob.

Gedruckt mit Genehmigung der medizinischen Fakultät  
zu Erlangen.

Referent: Prof. Dr. Frommel.

Meinen lieben Eltern.



Digitized by the Internet Archive  
in 2026

Schon früher wurde in einzelnen Fällen von Langenbeck, Santer, Recamier, Hennig u. a. Die Exstirpation des carcinomatös entarteten Uterus von der Scheide aus vorgenommen. Allein den wenigen dadurch erzielten Heilungen standen so zahlreiche unglückliche Operationen gegenüber, dass man fortgesetzten Versuchen mit den bisherigen, höchst ungenügenden Methoden nicht das Wort reden konnte.

Erst Freund war es vorbehalten, die Frage der Totalexstirpation des Uterus aus dem Stadium ziemlich roher empirischer Versuche auf eine wirklich wissenschaftliche Grundlage zu erheben. Im Jahre 1870 gab er eine neue Methode der Uterusexstirpation an und zwar wählte er den Weg durch die Bauchdecken. Allein die weitgehenden Erwartungen, die man an diese Operation knüpfte, konnten sich nicht erfüllen. Die ungünstigen Resultate wurden Anlass, die alte Santer-Recamier'sche Methode wieder aufzunehmen.

Der erste ausführlicher begründete neuere Vorschlag zur Totalexstirpation per vaginam stammt von Czerny. In ähnlicher Weise operierten dann Billroth, Schede und Schröder und zwar mit so entschiedenem Erfolg, dass die vaginale Methode den ersten Platz in der Behandlung des Gebärmutterkrebses errang, den sie auch heute noch behauptet.

Was nun die Frage betrifft nach dem heutzutage durch diese Operation erzielten Erfolge, so gewinnen wir das beste Urteil darüber durch andauernde Kontrolle der operierten Frauen; wir erfahren die Resultate aus den von den verschiedenen Operateuren aufgestellten Statistiken.

Einen Beitrag zur Lösung der Frage über die Dauererfolge der Totalexstirpation bei Carcinoma uteri zu liefern, ist nun der Zweck vorliegender Arbeit, welche ihre Entstehung der Anregung des Herrn Prof. Dr. Frommel verdankt, dem ich auch an dieser Stelle meinen herzlichen Dank auszusprechen mir erlaube.

Im Jahre 1894 wurde schon eine Statistik aus der hiesigen Frauenklinik veröffentlicht. Dieselbe erstreckt sich über die Operationen vom Jahr 1887 d. h. von der Zeit an, da Herr Prof. Frommel die Leitung der hiesigen Frauenklinik übernahm, bis 1893. Alle diese Fälle wurden kontrolliert und über die Operierten, die damals noch lebten, wurden von neuem Erkundigungen eingezo-gen. Ebenso wandten wir uns an die seit 1893 operierten Frauen. Alle wurden veranlasst, wenn möglich sich in der Klinik zu einer Untersuchung vorzustellen oder wenigstens eine ärztliche Meinungsäußerung über ihren Gesundheitszustand einzuschicken.

Es sind denn auch 17 Frauen in der Klinik selbst, einige von Aerzten untersucht worden. Natürlich fanden auch ziemlich viele Frauen, die absolut keine Beschwerden haben, keine Veranlassung, sich vorzustellen oder sich von einem Arzt untersuchen zu lassen. Nach ihren schriftlichen Berichten wurden die betreffenden nur dann als gesund bezeichnet, wenn sie sich durchaus wohl befanden und keinerlei örtliche Symptome zeigten.

Die Todesursache ist amtlich festgestellt und wo sie irgend zweifelhaft erschien, nachträglich vom behandelnden Arzt bestätigt bzw. richtig gestellt worden.

Die Auffindung des Wohnorts und Feststellung der Todesursache war oft recht mühsam und schwierig und nur möglich mit ausgedehntester Inanspruchnahme der Herren Aerzte, der Polizeibehörden und Gemeindeverwaltungen, die uns alle in danken swertester Weise entgegenkamen und behülflich waren.

Wenden wir uns nun zur Sache selbst. Von 1887—1897 kamen im Ganzen 402 Kranke mit Uteruscarcinom zur Be-

handlung. Bei 319 Frauen war das Carcinom nicht mehr operabel, bei 83 wurde die Radikaloperation vorgenommen.

Das ergibt einen Prozentsatz von 20,6 % operabler Fälle. Die Höhe dieser Ziffer hängt im Wesentlichen ab von der Intelligenz der Bevölkerung, dem höheren oder geringeren Masse, in welchem dem Publikum gynäkologische Hilfe bereit steht und zuletzt von der Individualität des Operateurs.

Die Olshausen'sche Klinik hat bisher die günstigste Ziffer; sie hat 46 % operabler Fälle aufzuweisen und dabei verfährt Olshausen streng in der Auswahl. Fritsch hatte in Breslau 19,5 %, sein Nachfolger Küstner 22,8 %, v. Kèzmàrsky in Budapest nur 10 %, Pernice 25,5 %, Olshausen in seiner letzten Zeit in Halle ca. 30 %, sein Nachfolger Kaltenbach 40 %, Thorn in Magdeburg 35 %. Aus diesen Zahlen lässt sich die Bedeutung jener Faktoren unschwer herauslesen.

Die in der hiesigen Klinik gemachten Operationen wurden in der weitaus grössten Anzahl der Fälle nach der vaginalen Methode, einige nach der von Freund und Zuckerkandl angegebenen Methode mit verschiedenen Modifikationen ausgeführt.

Der Operation ging nahezu in allen Fällen die Untersuchung in Narkose und genaue Abtastung des Beckenbindegewebes voran. In zweifelhaften Fällen half die mikroskopische Untersuchung ausgeschabter oder ausgeschnittener Schleimhautstücke zur Stellung einer sichern Diagnose.

Die Operation selbst wurde folgendermassen ausgeführt: Patientin wird in Steissrückenlage gebracht, Scheide und Operationsfeld mit Wasser und Seife, alsdann mit Alkohol und Sublimat gründlich desinfiziert. Dabei wird hauptsächlich auf die Desinfektion des Carcinoms selber geachtet. Handelt es sich um irgendwie jauchende oder geschwürig zerfallene Neubildungen, so werden dieselben mit dem scharfen Löffel abgekratzt und mit absolut desinfizierenden Lösungen abgerieben. Der Grund der Neubildungen wird mit dem Glüheisen verschorft. Bei Carcinomen des Uterus-

körpers wird die Desinfektion auch auf diesen selbst ausgedehnt. Damit während der Operation beim Anziehen des Uterus aus dem Cervix keine stinkenden Massen herausquellen, werden durch denselben mehrere Seidenfäden gelegt, die einerseits zum Verschluss, andererseits zum Herabziehen und Fixieren des Uterus dienen.

Ist die Scheide eng und unnachgiebig, so wird der Damm oder das ganze Scheidenrohr an einer oder beiden Seiten gespalten. Nach Freilegen der Portio und Herabziehen mit Museux'schen Zangen oder mit Seidenfäden, wird an der am leichtesten zugänglichen Stelle, gewöhnlich vorne, möglichst überall  $1\frac{1}{2}$  bis 2 cm. von der Grenze des Krankhaften entfernt das Scheidengewölbe rings um den Cervix eröffnet, indem die seitlichen Scheidengewölbe mit breiten Hebeln freigelegt werden. Spritzende Arterien werden mit Klemmen gefasst oder umstochen. Ist vorn die Blase möglichst hoch hinaufpräpariert und der Cervix auch hinten und seitlich weit herauf aus dem Bindegewebe und der Scheidenschleimhaut gelöst, dann wird der gefässführende Teil der ligamenta lata mit einer Aneurysmanadel durchstoichen. Ist die Ligatur geknotet, wird das abgebundene Stück mit einem Scheerenschnitt vom Cervix getrennt, darauf das nächst höhere Stück unterbunden. Ist dann der Cervix auf der einen Seite abgelöst, wird es auf der anderen Seite ebenso gemacht. Die ligg. lata werden in der Regel in situ, d. h. ohne weitere Lageveränderung des Uterus unterbunden. Nach fester Knotung wird das abgebundene Stück vom Uterus abgetrennt und man fährt so fort, bis die letzte Ligatur um Tuben und Ovarien gelegt ist. Ist die Abtrennung auf der einen Seite erfolgt, gleitet der Uterus gewöhnlich heraus, indem er nur noch am obern Teil der Anhänge der andern Seite hängt; dann wird die Abbindung dieses Restes der Anhänge vollendet.

In die grosse klaffende Peritonealwunde, in welche oft Därme und Netz vorkommen, wird ein angesetzter Gazetampon geschoben. Die ganze Wundhöhle wird jetzt freigelegt um überblicken zu können, ob irgendwo Blut durch-

sickert. Ist dies der Fall, wird die blutende Stelle in eine Klemme gefasst und umstochen. Oefter, besonders früher, erfolgte eine Ausspülung der ganzen Beckenbindegewebswunde.

Die Operationsstümpfe werden sodann in die seitlichen Wundränder hereingeleitet. Früher wurden auf beiden Seiten einige Nähte angelegt, die Mitte des Wundkanals blieb offen und wurde mit Jodoformgaze tamponiert, während in letzter Zeit nach Entfernung des angeseilten Schwammes durch die vordere Scheidenwand, beide Peritonealblätter und hintere Scheidenwand eine Catgutnaht gelegt wird, worauf eine Jodoformgazetamponade der Scheide erfolgt.

In 5 Fällen wurden die von Richelot empfohlenen Klammern zur Kompression der ligg. lata angewandt. Der Uterus wird von vorn und hinten abgelöst, die ligg. lata wurden in umfassende Klammern gelegt und nun wird der Uterus abgetrennt. Die Klammern werden dann nach 24 Stunden etwas gelockert, nach 48 Stunden abgenommen. Der Primärerfolg dieser Fälle war gut; 2 wurden rückfällig, 3 sind bis heute recidivfrei.

Hofmeier äussert sich über die Operation mit Klemmen folgendermassen: Im Allgemeinen hat das Verfahren in Deutschland ausser von Landau nicht viel Beifall gefunden, augenscheinlich, weil bei der ausgebildeten Technik der Operation kein erhebliches Bedürfnis dafür vorhanden ist. Doch ist die Anwendung von Klemmen, welche 48 Stunden liegen bleiben, bei schwer zu stillenden Blutungen aus den unterbundenen Stümpfen unter Umständen sehr bequem. Auch kann es bei ungewöhnlichen Schwierigkeiten bei der Unterbindung sehr angenehm sein, einzelne Teile der ligg. lata in dieser Weise zu versorgen.

In Kombination mit den oben geschilderten Verfahren kam in einigen Fällen die Freund'sche Methode zur Ausführung und zwar in der Weise, dass zuerst von der Scheide aus die Totalexstirpation begonnen wurde, jedoch durch unvorhergesehene Hindernisse dieses Vorhaben unterbrochen werden musste und man sich für die Laparotomie zur Vollendung der Operation entschied. Nur einmal war es um-

gekehrt der Fall, dass zuerst mit der Laparotomie begonnen wurde, jedoch wegen zu grosser Blutung die Operation per vaginam zu Ende geführt werden musste.

Die dritte hier angewandte Methode ist die von Zuckerkandl angegebene und von Frommel zuerst ausgeführte perineale Methode.

Eingeleitet wird dieses Verfahren durch Umschneiden des Scheidengewölbes und Lospräparieren der Blase wie bei der vaginalen Totalexstirpation. Sodann wird ein bogenförmiger Schnitt von einem Taber ischii zum andern geführt, der Damm gespalten und auf stumpfem Weg zwischen Scheide und Mastdarm vorgedrungen. Ist man am Douglas angelangt, so wird eine breite Peritonealwunde angelegt. Hierauf wird, nachdem man mit der Hand in das Peritoneum eingegangen ist, der Uterus umgekippt und auf beiden Seiten abgebunden.

Wenden wir uns nun nach Schilderung der Operationsmethoden zu den einzelnen Fällen selbst, so erscheint es uns dringend notwendig zum bessern Verständnis Auszüge aus den Kranken- und Operationsberichten zu geben zugleich mit einer kurzen Angabe über den primären und den dauernden Erfolg. Dabei sind auch die schon früher beschriebenen Fälle mit aufgeführt, einmal, um die Sache zu einem abgeschlossenen Ganzen zu gestalten und dann, weil die Resultate von damals heute doch wesentlich anders erscheinen. Zur bessern Uebersicht und leichteren Orientierung soll das Ganze in Form einer Tabelle folgen.

(Siehe Tabelle I Seite 12.)

Wie sich aus der Tabelle ergibt, so trat das Carcinom fast immer unter den typischen Symptomen auf: unregelmässige Blutungen, Ausfluss, zuweilen Schmerzen im Kreuz und im Leib, zunehmende Schwäche und Abmagerung.

Was das Alter der operierten Frauen betrifft, so ergibt sich ein Durchschnittsalter von 46,2 Jahren und zwar für die Collumkarzinome ein Durchschnitt von 43,6 Jahren. Die jüngste war 22, die älteste 69 Jahre alt. Für die Corpuskarzinome beträgt der Altersdurchschnitt 53,5 Jahre. Die

älteste war 73 Jahre alt und ist auch heute noch nach Jahren völlig gesund und recidivfrei. Die jüngste stand im 33. Lebensjahr.

In 63 Fällen handelte es sich um Collum-, in 20 Fällen um Corpuscarcinom. Die durch die Radikaloperation erzielten Erfolge sollen für beide Arten gesondert betrachtet werden und zwar getrennt in primäre und sogenannte Dauerresultate.

Tabelle I.

| Name,<br>Alter                | Menses                                                                                              | Geburten<br>nor-<br>male                               | Fehl-<br>geb. | Beschwerden. Dauer des Leidens.<br>Etwaige vorherige Behandlung. Befund                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Ko. B.<br>62 Jahre<br>alt. | M. bestehen<br>seit dem 13.<br>Lebensjahre,<br>stark,<br>schmerzhaft.<br>Menopause im<br>45. Jahre. | 1 Par-<br>tus vor<br>24 Jah-<br>ren                    | —             | Seit 2 Jahren unregelmässige Blu-<br>tungen.<br>Befund: Ulcerationen der hint. Mut-<br>termundslippe. Cervix mit weichen Masse<br>ausgefüllt. Corpus eigentümlich prall<br>Gefühl, aber beweglich. Linke Anhäng-<br>frei, rechts infiltrierte Partie vom Ut-<br>erus gegen die Beckenwand.                                                                                            |
| 2) Sch. A.<br>33 J. alt.      | M. seit dem<br>17. Lebens-<br>jahre, regel-<br>mässig.                                              | multi-<br>par.                                         | —             | Seit 1/2 Jahr atypische Blutungen, übe-<br>riechender Ausfluss. Ausschabung<br>Uterus.<br>Befund: Ut. am Corpus vergrössert<br>Lage normal, Anhänge normal; rech-<br>lig. rect. uterin-mässige Verdickung un-<br>Empfindlichkeit, die aber nicht als ca-<br>cinomatös angesprochen wird.                                                                                              |
| 3) Pf. H.<br>29 J. alt.       | M. seit dem<br>14. Jahre.<br>Regelmässig<br>4—5 Tage<br>alle 4 Wochen.<br>Vor 1 Mon.<br>letzte R.   | 1 Par-<br>tus vor<br>12 J.                             | —             | Seit 5 Monaten atypische Blutungen<br>Schwäche, Schmerzen im Kreuz.<br>Befund: Port. vag. in einen kleinen<br>apfelgrossen zerklüfteten Tumor ver-<br>wandelt. Vordere Muttermundslippe<br>noch intakt. Muttermund für 1 Finger<br>durchgängig. Cervikalkanal ebenfalls<br>stark zerklüftet. Corp. ut. etwas ver-<br>grössert, retrovertiert, teilweise fixiert,<br>doch aufrichtbar. |
| 4) Br. M.<br>47 J. alt.       | Aus der<br>Anamnese<br>nichts zu ent-<br>nehmen.                                                    | —                                                      | —             | Seit 1/4 Jahr heftige unregelmässige<br>Blutungen, übelriechender Ausfluss<br>Kreuzschmerzen.<br>J. U.: Verdickung der Port. vag.<br>Muttermund für 1 Finger durchgängig<br>Im Cervikalkanal zottige Massen, leicht<br>blutend und in das vergrösserte Cor-<br>pus sich fortsetzend. Parametrien nicht in-<br>filtriert.                                                              |
| 5) Fr. R.<br>49 J. alt.       | Menses stets<br>regelmässig<br>schwach.<br>Menopause im<br>47. Lebens-<br>jahre.                    | 4 nor-<br>male Ge-<br>burt.,<br>letzte<br>vor<br>10 J. | —             | Kurze Zeit nach Aufhören der regel-<br>mässigen Menstruation starke und hä-<br>ufige Blutungen.<br>J. U.: Port. vag. krebsig zerfallen<br>Corp. ut. starr, doch noch beweglich<br>Bänder und Tuben scheinen frei.                                                                                                                                                                     |

Tabelle I.

| Diagnose                    | Operation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unmittelbarer Erfolg                  | Weiterer Verlauf.                                                                                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c. ade-<br>omat.<br>rp. ut. | Operation sehr schwierig. 14. V. 87. Wegen der Infiltration rechts wird das rechte lig. lat. 2 cm vom Ut. entfernt abgebunden. Beim Vernähen des Periton. Abgleiten einer Massenligatur; starke Blutung. Tamponade der Scheide mit Jodoformgaze.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13. VI. 87<br>geheilt ent-<br>lassen. | 22. VII. 88 †.<br>Todesursache<br>unbekannt.                                                                         |
| c. corp.<br>uteri.          | Operation in typischer Weise durch-<br>geführt; ohne Schwierigkeit.<br>Wunde in der Mitte offen, mit Jodoform<br>bestreut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geheilt ent-<br>lassen.               | Im Jahre 94<br>vollständig<br>gesund und<br>recidivfrei.                                                             |
| c. port.<br>ginalis.        | Op. 10. II. 88.<br>Entfernung der meist zerfallenen Parti-<br>en mit dem scharfen Löffel. Alsdaun<br>Exstirpation in typischer Weise; jedoch<br>werden die gesunden Ovarien zurück-<br>gelassen. Blutung nicht stark. Tam-<br>ponade mit Jodoformgaze. Wundverlauf<br>ohne Störung. Am 18. II. werden die<br>Nadeln entfernt.                                                                                                                                                                                             | 4. III. 88<br>geheilt ent-<br>lassen. | 1. X. 88<br>faustgrosses<br>Recidiv im<br>linken Para-<br>metrium.<br>23. V. 89 †.<br>Kachexie.                      |
| c. corp.<br>ut.             | Op. 23. II. 88.<br>Operation in typischer Weise. Eine<br>Stelle links im Parametrium erscheint<br>suspect. Peritonealhöhle bleibt offen.<br>Blutung mässig stark. Heilung geht<br>glatt von statten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | Daten über<br>Entlassung<br>etc. fehlen.<br>Ueber weite-<br>ren Verlauf<br>war nichts in<br>Erfahrung zu<br>bringen. |
| c. cerv.                    | Op. 29. II. 88.<br>Umschneidung und Zurückschieben der<br>Blase. Auffindung des Douglas macht<br>grosse Schwierigkeiten, es wird eine<br>förmliche Höhle ins prorectale Gewebe<br>gesetzt. Beim Abbinden auf der linken<br>Seite schneidet jeder Faden an einer<br>weichen brüchigen Stelle durch, sodass<br>wohl carcinomatöses Gewebe im linken<br>Parametrium zurückgelassen werden<br>muss. Blutung steht völlig nach Her-<br>ausnahme des vergr. Ut. Abdominal-<br>öffnung bleibt offen. Jodoformgaze-<br>tamponade. | † an Perito-<br>nitis 5. III. 88.     |                                                                                                                      |

| Name,<br>Alter           | Menses                                                                 | Geburten<br>nor-<br>male | Fehl-<br>geb. | Beschwerden. Dauer des Leidens.<br>Etwaige vorherige Behandlung. Befund                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6) H. A.<br>43 J. alt.   | M. regelmässig bis vor 2 Jahren; seither unregelmässig.                | 4 spontane Geburten      | —             | Leib- und Kreuzschmerzen; starke Blutung und eitriger Ausfluss seit 1 J.<br>J. U.: Im hinteren Scheidengewölbe das von der Port. ausgehende, hühnereigrosse, teilweise ulcerierte Carcinom mit schmalem Saume auf die Scheide übergreifend. Corp. ut. nicht vergrössert, gut beweglich. Ligg. anscheinend ohne Infiltr.                  |
| 7) M. M.<br>43 J. alt.   | M. seit dem 15. J. regelm. bis vor $1\frac{1}{2}$ J. 8—10 Tage, stark. | 3 Geb. letzte vor 10 J.  | —             | Blutabgang seit $\frac{3}{4}$ Jahr; Schmerzen im Rücken, weisser Fluss. Appetitlosigkeit, starke Abmagerung.<br>J. U.: 3 cm hinter dem Intr. v. höckeriges, an der Oberfl. zerfallendes von der hint. Mmlippe ausgehendes Cancroid. Corp. klein, beweglich. A. hängt ohne Infiltr.                                                       |
| 8) Fr. K.<br>39 J. alt.  | Seit dem 16. J. alle 3 Wochen, spärlich. Letzte Menstr. vor 8 Wochen.  | 1 Part. vor 17 J.        | —             | Seit 3 Wochen Schmerzen im Kreuz.<br>J. U.: Im hint. Scheidengew. taubereingrosser, von der vord. Mmlippe ausgehender Tumor mit zerklüft. leicht blut. Oberfl. Hint. Mmlippe klein, Cervix schlank, Corp. ut. normal gross, bewegl. Parametrien frei.                                                                                    |
| 9) Pei. A.<br>33 J. alt. | Seit dem 14. J. Anf. unregelmässig, später stets regelm.               | 4 Geb. letzte vor 4 J.   | —             | Brennender Schmerz im Leib. Blutungen, Stuhl drang.<br>Bef.: Port. verdickt. Aus dem Mut. ragt ein wallnussgrosser, von der Cervixschleimhaut ausgehender, ulcerierter leicht blutender Krebsknoten hervor, an einer Stelle auf die hint. Lippe und mit schmalem Saum auf die Scheide übergehend. In den Parametrien nicht nachzuweisen. |
| 10) W. B.<br>53 J. alt.  | Seit dem 15. J. regelmässig stark. Seit 7 M. cessiert.                 | 3 Geb. zuletzt vor 10 J. | —             | Weissl. schleimiger Ausfluss. Seit 10 Monaten kann Pat. den Urin nicht mehr halten.<br>J. U.: An Stelle der Port. gr. tiefer in die Scheide hineinragender Tumor leicht blutend. Hinten Uebergang in die Scheide. Corpus ut. etwas vergrössert, leicht beweglich. Parametrien vom Carcinom noch nicht ergriffen.                         |

| Diagnose           | Operation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unmittelbarer Erfolg                                                                       | Weiterer Verlauf.                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| arc. port.<br>vag. | Op. 2. III. 88.<br>Operat. sehr schwierig und ungünstig. Starke Blutung beim Abbinden der l. Seite. Nach Entfernung des Uterus tropfenweise, kontinuierl. Blutung aus der linken Ecke. Kräftige Tamponade. Katheder mit Blut gefüllt, da wahrscheinlich die Blase verletzt wurde. Pat. kommt pulslos ins Bett, erholt sich gegen Abend. Aus der Scheide sickert fortwährend Blut. | 3. III. Pat. stark collabiert. Puls klein, blutiger Urin. † an Verblutung.                 | —                                                                            |
| arc. port.<br>vag. | Op. 25. I. 89.<br>Ut. in situ herausgenommen. Scheide gegen die Bauchhöhle teilweise offen. Drainage mit Jodoformgaze. Wundverlauf gut.                                                                                                                                                                                                                                           | 14. II. Pat. geheilt entlassen.                                                            | 24. II. Recidiv. † Nov. 1890.                                                |
| arc. port.<br>vag. | Op. 15. V. 89.<br>Zuckermandl'sche Methode. Operation ohne besondere Schwierigkeit. Perit. vollst. verschlossen. Wundhöhle im Sept. rect. vag. tamp. mit Jodoformgaze.                                                                                                                                                                                                            | 20. VI. 89 geheilt entlassen.                                                              | XII. 1897 stellte sich Pat. in der Klinik vor. Gesund und recidivfrei.       |
| arc. port.<br>vag. | Op. 30. III. 89.<br>Oper. ohne besondere Schwierigkeit. Rechte und linke Anhänge abgebinden; Ut. entfernt. Perit. offen. Jodoformgasetamponade. Heilung geht glatt ab.                                                                                                                                                                                                            | 19. IV. geheilt; Entlassung.                                                               | 19. XII. 97 stellt sich Pat. vor und ist vollständig gesund und recidivfrei. |
| arc. port.<br>vag. | Op. 14. XII. 89.<br>Op. mit zieml. Schwierigk. verbunden. Unterbindung der Param., Abbindung der Anhänge beiderseits. Herausnahme des Ut. ohne Ovarien. Im hint. Scheidengewölbe finden sich noch 2 carcinomatöse Stellen, die exstirpiert werden. Periton. vernäht, Anblasen mit Jodoform.                                                                                       | Nach der Op. völliges Wohlfinden. Heilung geht rasch von statten.<br>7. I. 90. Entlassung. | 5. II. 90. Recidiv. † 1892.                                                  |

| Name,<br>Alter                    | Menses                                                                 | Geburten                           |                         | Beschwerden. Dauer des Leidens.<br>Etwaige vorherige Behandlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                        | nor-<br>male                       | Fehl-<br>geb.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11) Pu. E.<br>46 J. alt.          | Erste mit 19 J.<br>stets regel-<br>mässig.                             | 2 Part.<br>letzter<br>vor<br>20 J. | —                       | Seit 3—4 Mon. Blutabgang. Seit 6 Mo-<br>schweres Zurückhalten des Urins.<br>J. B.: Corp. nicht vergrößert. An<br>Stelle der Port. warzenförmiger, bei Be-<br>rührung blutender die Scheide erfüllen-<br>der Tumor. Umgreifen desselben nicht<br>möglich. Tuben und Ligg. frei.                                                                                                       |
| 12) Dö. B.<br>32 J. alt.          | Erste mit 15 J.<br>stets regel-<br>mässig.                             | 3 Part.<br>letzter<br>vor<br>2 J.  | 1 vor<br>8 Jah-<br>ren. | Seit 3 Mon. starke Blutung, weissen<br>Ausfluss.<br>J. U.: Faustgr. zerklüfteter, leicht<br>blutender Tumor der hinteren Lippe<br>(Cancroid); auf die Scheide nicht über-<br>greifend. Corp. klein, leicht beweglich.<br>Tub. und Ovar. normal. Parametrien<br>intakt.                                                                                                               |
| 13) Eck. M.<br>35 J. alt.         | Seit 16. J.<br>regelmässig.                                            | 4 Part.<br>letzter<br>vor<br>3 J.  | —                       | Vor 3 J. Scheidenpolyp, den der Arzt<br>wegnahm. Vor 3 Mon. Wiederauftreten<br>eines Tumors, den der Arzt wegbrannte<br>Ausfluss, Mattigkeit, Abmagerung.<br>J. U.: Vord. Mmlippe in ein leicht<br>blutendes, kinderfaustgrosses, zerklüft.<br>Cancroid verwandelt; rechts 1 cm auf<br>die vordere Vaginalwand übergehend<br>Hint. Lippe vernarbt, Corp. klein. An-<br>hänge normal. |
| 14) Schw.<br>K.<br>36 1/2 J. alt. | Seit dem 16. J.<br>regelmässig<br>immer mit<br>Schmerzen<br>verbunden. | 6 Part.<br>letzter<br>vor<br>6 J.  | —                       | Seit 1/2 J. übelriechender Ausfluss; in<br>letzter Zeit profuse Blutungen.<br>J. B.: Zwischen vord. u. hint. Vaginal-<br>wand höckeriger, sammtartiger Tumor<br>von der vord. Mmlippe ausgehend und<br>die Scheide nahezu ausfüllend. Hinter-<br>Mmlippe intakt, Anhänge normal.                                                                                                     |
| 15) Mo. M.<br>22 J. alt.          | Seit 15 Jahren<br>regelmässig.                                         | —                                  | —                       | Seit 6 Mon. prof. Menses, seit 14 Tagen<br>andauernde Blutung. Februar 90 von<br>ihrem Arzt operiert. Art der Operation<br>unbekannt.<br>Aus dem Mm. ragt ein zerklüft. leicht<br>blutender Tumor. Vord. Lippe seitlich<br>in Zerfall begriffen. Auf der rechten<br>Seite geht der Tumor direkt auf die<br>Lippe über. Scheide und Parametrien<br>frei.                              |

| Diagnose  | Operation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unmittelbarer Erfolg                                                                                                                                                                                                              | Weiterer Verlauf.                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| port. ag. | 23. XI. 89. Auskratzung und Verschorfung des Tumor. Wegen zu starker Blutung Operation verschoben.<br>25. XI. 89. Exst. nach Zuckerkandl. Ligaturen durch die Parametr. Rechtes Ov. bleibt zurück, linkes wird mitgenommen. Perit. geschlossen; Ausstopfung mit Jodoformgaze.<br>Dauer der Op. 4 St. 15'.<br>Puls am Ende der Op. klein, frequent. | Pat. erholt sich nicht post. op. Es tritt Somnolenz ein.<br>† 26. XI. infolge Shok.                                                                                                                                               | —                                                                                                |
| port. ag. | Op. 16. XII. 89.<br>Op. in typ. Weise ohne bes. Schwierigkeit. Rechtes Ovarium bleibt zurück. Periton. geschlossen.<br>Heilung glatt.                                                                                                                                                                                                              | 12. I. 90 Entlassung.<br><br>Erhebung im rechten Scheidengewölbe. Mikroskopische Untersuchung der aus dieser Stelle entnommenen Partikelchen lassen sich nicht als carcinomatöse Wucherung erkennen.<br>† 2. XII. 91 an Carcinom. | 17. IX. 1890 Untersuchung in der Klinik. Wallnussgr.                                             |
| port. ag. | 8. IV. 90. Verschorfung der zerfallenen Carcinommassen mit Thermokauter. Op. (11. IV.) in übl. Weise. Abbinden der Anhänge beiderseits; beide Ovarien zurückgelassen.<br>Wundverlauf gut.                                                                                                                                                          | 30. IV. 90 geheilt.                                                                                                                                                                                                               | † 27. XI. 1890. Todesursache? Syphil. Nekrose des Stirnbeins. Pachymeningitis. Carcinom-recidiv. |
| port. ag. | Op. 7. V. 90 ohne Schwierigkeit. Linkes Ovarium bleibt zurück.<br>Heilverlauf glatt.                                                                                                                                                                                                                                                               | 28. V. 90 entlassen.                                                                                                                                                                                                              | August 92 gänseeigr. Recidiv.<br>† April 94 an Recidiv.                                          |
| port. ag. | Op. 22. V. 90 in übl. Weise ohne bes. Schwierigkeit. Wunde vernäht.<br>Heilung normal.                                                                                                                                                                                                                                                             | 25. VI. geheilt entlassen.                                                                                                                                                                                                        | † 30. IX. 1890.                                                                                  |

| Name<br>Alter            | Menses                                                                                                                          | Geburten<br>nor-<br>male          | Fehl-<br>geb. | Beschwerden. Dauer des Leiden<br>Etwaige vorherige Behandlung. Befund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16) H. A.<br>56 J. alt.  | Seit 17. J.<br>regelmässig.<br>Menopause<br>im 53. J.                                                                           | 3 Geb.<br>letzte<br>vor<br>23 J.  | —             | Seit langer Zeit scharfer Ausfluss, J. U.: Port. ein leicht blut. zerkle. Tumor. Vord. Mmlippe in ger. Gr. afficiert, von der hinteren geht das C. auf die Scheide über. Parametr. fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17) El. B.<br>56 J. alt. | Mit dem 18. J.<br>regelmässig<br>bis zur 1. Ent-<br>bindung.<br>Stets mit<br>Kreuzschm.<br>verbunden.<br>Menopause<br>im 53. J. | 3 Geb.<br>zuletzt<br>vor<br>15 J. | —             | Seit einigen Monaten fleischfarb. Ausfluss, hier und da mit Blut geme. Heftige Kreuzschmerzen. J. U.: Portio dick, Mm. quergespalt. geöffnet. Der Finger dringt in eb. buchtige, zerklüftete blutende gro. Höhle ein, welche sich nach oben rech. verfolgen lässt und das Corp. ut. sein scheint. Links geht oben e. faustgrosser, weicher Tumor in d. Corp. ut. über, in welchen die Son. sich nicht einführen lässt. Tuben u. Ligg. normal, Ovarien atrophisch.                                                                                                                                            |
| 18) K. M.<br>69 J. alt.  | regelmässig<br>seit dem<br>17. Lebensj.<br>Menopause<br>im 48. J.                                                               | 7 Geb.                            | —             | Seit 13 Jahren Kreuzschmerzen, welche von einem chir. Eingriff herrühren soll. In letzter Zeit blutig-gelbl. Ausfluss. J. U.: Port. kurz u. ulceriert. Ulceration geht auf die l. Scheidenwand über. Cervixhöhle weit, klaffend u. in ganzer Ausdehnung ulceriert u. höckerig, leicht blutend. Ut. retrov. aber beweglich. Ovarien atrophisch. Parametrien frei.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19) M. B.<br>55. J. alt. | regelmässig<br>seit dem<br>19. Lebensj.<br>Menopause<br>im 53. J.                                                               | 6 Geb.<br>zuletzt<br>vor<br>17 J. | —             | Seit 2 Monaten Zunahme des Abdom. an Umfang. Schmerzen im Leib Kreuz. Seit $\frac{3}{4}$ Jahr weissl. Ausfluss in letzter Zeit nicht mehr. Erschwerter Stuhlgang, Blähungen; eine Zeit lang erschwertes Wasserlassen. J. U.: Ut. reicht mit dem Fundus zum Nabel. Knollige Auftreibung. Cervixhöhle carcinomatös ulceriert, blutend. Uterushöhle fühlt sich zerfallen an. Sonde geht nicht weiter als normal hinauf. Beiderseits, besonders links, den Parametr. flächenhafte Resistenz, glatt und knollig. Der ganze Ut., durch ein Myom vergrössert, scheint auffallend beweglich. Scheide frei. Carcinom. |

| Diagnose                                | Operation                                                                                                                                                                                                                             | Unmittelbarer Verlauf             | Weiterer Verlauf.                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| re. port. vag.                          | Op. 8. VII. 90.<br>Scheide senil atrophisch; deshalb Incisionen in die Labien nötig. Ovarien bleiben zurück.<br>Heilverlauf gut.                                                                                                      | 25. VII. 90<br>geheilt entlassen. | † in der Heimat laut Bericht.<br>Ueber Todesursache war nichts zu ermitteln. |
| re. cerv. erb. mit Myoma p. utin-terst. | Op. 25. VIII. 90.<br>Bei Unterbindung des l. Parametr. gewinnt es den Anschein, als ob etwas in carcinomat. Gewebe gearbeitet worden wäre. Die senil atr. Ov. bleiben zurück. Vollst. Verschluss der Wunde.<br>Jodoformgazetamponade. | 17. IX. 90<br>geheilt.            | 20. X. 90<br>recidivfrei.<br>† 8. VIII, 91<br>an Recidiv.                    |
| re. cero.                               | Op. 31. I. 91 ohne bes. Schwierigkeit. Abbindung links vom Cervix nicht ganz in gesundem Gewebe. Totaler Wundverschluss.                                                                                                              | 13. II. 91.<br>geheilt.           | † 7. VII. 91<br>an Recidiv.                                                  |
| carcinomatös egen. Myom.                | Oper. 2. III. 91. Freund'sche Methode mit Modificationen. Op. wegen Ausichtslosigkeit auf Erfolg unterbrochen, da der bis zum Nabel reichende Ut. sich als eine grosse Carcinommasse präsentierte.                                    | † 6. III. 91.                     | Sectionsbef.:<br>Kindskopf<br>grosses Carcinom des Uterus                    |

| Name<br>Alter                     | Menses                                               | Geburten<br>nor-<br>male                           | Fehl-<br>geb.                               | Beschwerden. Dauer des Leidens.<br>Etwaige vorherige Behandlung. Befund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20) Ev. A.<br>65 J. alt.          | seit 15. J.<br>regelmässig<br>Menopause<br>im 52. J. | keine                                              | —                                           | Seit 12 Wochen Schmerzen im Leibe<br>starker weisser Ausfluss, mitunter blutig verfährt.<br>Bef.: Ut. etwas reponiert. Corpus etwas<br>wenig vergrössert, keine knolligen Erhebungen. Port. und Cervix unverändert. Dagegen hint. Uterusfl. uneben. Parametrien frei.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21) Mü. A.<br>57 J. alt.          | seit 19. J.<br>regelmässig<br>Menopause<br>im 46. J. | VIII<br>Beider<br>VI.<br>schl.<br>Wochen-<br>bett. | 1                                           | Seit 19 Wochen geringer Blutabgang.<br>Seit 10 Wochen Schmerzen im Kreuz<br>und Unterleib.<br>J. U.: Ut. mässig vergr., Cervix in<br>einen tiefen durch Ulcerationen zer-<br>klüfteten Krater verwandelt. Carcinom<br>geht aufs hint. Scheidengewölbe über.<br>Parametrien frei.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22) He. M.<br>46 $\frac{1}{2}$ J. | seit 14. J.<br>regelmässig.                          | I vor<br>18 J.                                     | —                                           | Pat. klagt seit Febr. 90 über reissende<br>Schmerzen im Unterleib; vor allem auch<br>in den Seiten. Abmagerung, Mattigkeit.<br>J. U.: Port. derb. Cervikalkanal rauh,<br>uneben. Hinter. äusserem Mm. rauhe,<br>höckerige, brocklige Höhle, bei Berüh-<br>rung leicht blutend. Corp. normal ge-<br>lagert, vergr., mit einigen knolligen<br>Erhebungen bedeckt, an der hint. Wand<br>eine 5 Pfennigstückgrosse. Ut. hinten<br>etwas fixiert. Anhänge normal.                                                                            |
| 23) Pa. A.<br>49 J. alt.          | seit 19. J.<br>regelmässig,                          | IV l.<br>vor<br>13. J.                             | 1<br>Abort<br>im V.<br>Mon.<br>vor<br>26 J. | Dysmennorrhoe und Menorrhagie seit<br>ein Jahr. Seit 4 Wochen Kreuz-<br>schmerzen, in letzter Zeit andauernde<br>Blutungen.<br>J. U.: Ut. vergr. und empfindlich<br>Cervixschleimhaut durch carcinomatöse<br>Wucherungen zerstört; scheinen bis in<br>den Fundus hinaufzugehen. Uterus-<br>schleimhaut sehr rauh und leicht<br>blutend. Im Parametr. links, bes. rechts<br>Infiltrationen, die aber nicht sicher als<br>carcinomatös erkannt werden. Knoten-<br>bildung im Parametr. nicht nachweisbar.<br>Tuben und Mutterbänder frei. |

| Diagnose             | Operation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unmittelbarer Erfolg                                                               | Weiterer Verlauf.                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| arc. corp. ut.       | Op. 21. IV. 91 mit ziemlich bedeutenden Schwierigkeiten verknüpft. Uterus sehr brüchig. Plötzliches Abreissen des Cervix und des unteren Teiles des Uteruskörpers. Starke Blutung. Laparotomie. Nach Stillung der Blutung wird Op. von der Scheide aus beendet. Wunde in der Mitte offen, Jodoformgazetamponade.         | 2. V. 91 †. Peritonitis.                                                           | †                                                           |
| arc. cerv.           | Op. 9. V. 91 in typischer Weise. Eröffnung des Douglas schwierig. Unterbindung der Parametrien bis $\frac{2}{3}$ gegen den Fundus. Totaler Verschluss. Jodoformgazetamponade.                                                                                                                                            | Wundverlauf 20 V. geheilt.                                                         | 18. X. 1892 grosses Scheidenrecidiv.<br>† 2. IV. 1893.      |
| arc. cerv. corp. ut. | Op. 1. XI. 91. Bei Umschneidung der linken Partie des Cervix hat es den Anschein, als ob nicht ganz im Gesunden operiert würde. Ziemlich bedeut. Blutung. Ut. morsch, bekommt Risse. Es ergiesst sich Jauche in die Scheide. Ausspülung. Ovarien bleiben zurück. Totaler Wundverschluss. Scheide tamp. mit Jodoformgaze. | 27. XI. geheilt.                                                                   | † 10. XII. 92. Ob an Recidiv konnte nicht ermittelt werden. |
| arc. cerv.           | Op. 22. VII. 91. Exstirp. in übl. Weise. Im rechten Parametrium Abtragung in gesundem Gewebe unmöglich. Die erwähnte infiltrierte Partie war doch carcinomatös.                                                                                                                                                          | 26. VII. Peritonitis-Erscheinungen.<br>27. VII. Kräfteverfall. Exitus letalis<br>† | †                                                           |

| Name,<br>Alter            | Menses                                                            | Geburten<br>nor-<br>male     | Fehl-<br>geb. | Beschwerden. Dauer des Leidens.<br>Etwaige vorherige Behandlung. Befund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24) Fö. M.<br>62 J. alt.  | Seit 16 Jahren<br>regelmässig.<br>Menopause<br>im 50 J.           | IV                           | —             | Seit 2 Jahren Blutausfluss, Schmerz<br>im Unterleib.<br>J. U.: Corp. ut. nicht vergrössert.<br>Uterusschleimhaut fühlt sich mit der<br>Sonde rau an, Cavum uteri scheint<br>sehr weit. Im rechten Parametrium<br>mässige, flächenhafte Verdickung.<br>Seit letzter Entbindung (1888) Kreuz-<br>schmerzen. Mai 91 3 Wochen lan-<br>dauernde Blutung.<br>J. U.: Port. rau, hart, leicht blutend.<br>Vord. Mmlippe bes. stark vergr., knollig<br>hart. Ut. etwas vergr., Uterusschleim-<br>haut blutet bei Sondierung.<br>Parametrien frei.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25) Po. M.<br>36 J. alt.  | Seit 15. J.<br>regelmässig<br>meist mit<br>Krämpfen<br>verbunden. | II<br>2 mal<br>For-<br>ceps. | —             | Seit einigen Monaten rötlich-weißer<br>Ausfluss. Mitunter Schmerzen.<br>J. U.: Ut. vergrössert. In die Scheide ragt<br>ein etwa gänseeigrosser, ulcerierter Tu-<br>mor, der als Cancroid der vorderen und<br>hinteren Mmlippe angesprochen wird.<br>Beiderseits spannen sich die Parametrien<br>im unteren Drittel straff an; rechts<br>scheint eine beginnende Infiltration vor-<br>handen zu sein. Nach oben scheint<br>sie frei von Metastasen. Anhänge norma-<br>l. Vor 10 Wochen starke Blutung bei<br>Coitus. Seit 6 Wochen andauernde<br>Blutabgang.<br>J. U.: An Stelle der vord. Mut-<br>termundslippe tiefer, jauchiger Tumor,<br>dessen Umgebung hart infiltriert ist.<br>Cervix verdickt. Cervixschleimhaut<br>scheint gesund. Ut. normal gross be-<br>weglich. Parametrien frei. Tuben u.<br>Bänder gesund. |
| 26) Sti. B.<br>45 J. alt. | Seit 15. J.<br>regelmässig.                                       | III<br>1. vor<br>12 J.       | —             | Seit 2 Mon. Ausfluss, in letzter Zeit<br>mit Blut gemischt.<br>J. U.: Port. in eine grosse, ulcerierte<br>mit jauchig zerfallenen Massen bedeckte<br>Geschwürsfläche verwandelt. Die U-<br>lceration von harter, wenig scharf be-<br>grenzter Infiltration umgeben. Nach<br>hinten greift das Geschwür auf das<br>Scheidengewölbe über, besonders we-<br>nach links. Cervix hart infiltri-<br>ert. Ut. vergrössert, normal gelagert. Bei<br>Herabziehen spannt sich das linke P-<br>rametrium stärker an. Eine deutliche<br>Infiltration oder Knoten sind jedoch<br>auf dieser Seite nicht nachweisbar.<br>Ovarien normal.                                                                                                                                                                                               |
| 27) Wu. M.<br>43 J. alt.  | Seit 18. J.<br>regelmässig.                                       | VIII                         | II.           | Seit 2 Mon. Ausfluss, in letzter Zeit<br>mit Blut gemischt.<br>J. U.: Port. in eine grosse, ulcerierte<br>mit jauchig zerfallenen Massen bedeckte<br>Geschwürsfläche verwandelt. Die U-<br>lceration von harter, wenig scharf be-<br>grenzter Infiltration umgeben. Nach<br>hinten greift das Geschwür auf das<br>Scheidengewölbe über, besonders we-<br>nach links. Cervix hart infiltri-<br>ert. Ut. vergrössert, normal gelagert. Bei<br>Herabziehen spannt sich das linke P-<br>rametrium stärker an. Eine deutliche<br>Infiltration oder Knoten sind jedoch<br>auf dieser Seite nicht nachweisbar.<br>Ovarien normal.                                                                                                                                                                                               |
| 28) Trö. K.<br>41 J. alt. | Seit 16. J.<br>regelmässig.                                       | VIII                         | —             | Seit 2 Mon. Ausfluss, in letzter Zeit<br>mit Blut gemischt.<br>J. U.: Port. in eine grosse, ulcerierte<br>mit jauchig zerfallenen Massen bedeckte<br>Geschwürsfläche verwandelt. Die U-<br>lceration von harter, wenig scharf be-<br>grenzter Infiltration umgeben. Nach<br>hinten greift das Geschwür auf das<br>Scheidengewölbe über, besonders we-<br>nach links. Cervix hart infiltri-<br>ert. Ut. vergrössert, normal gelagert. Bei<br>Herabziehen spannt sich das linke P-<br>rametrium stärker an. Eine deutliche<br>Infiltration oder Knoten sind jedoch<br>auf dieser Seite nicht nachweisbar.<br>Ovarien normal.                                                                                                                                                                                               |

| agnose         | Operation                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unmittelbarer Erfolg               | Weiterer Verlauf.                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| c. corp. ut.   | <p>7. IV. 91 Probeauskratzung.</p> <p>Op. 13. IV. 91 in typisch. Weise ohne bes. Schwierigkeit. Abbindung der Parametrien bis <math>\frac{2}{3}</math> der Länge des corp. ut. Wunde geschlossen. Jodoformtampnade.</p> <p>Heilverlauf glatt.</p>                                     | 3. V. 91 geheilt.                  | Bis zur Zeit recidivfrei. (10. XII. 97 stellte sich Pat. vor.                 |
| c. cerv.       | <p>Vor der Op. 2 Probeexcisionen.</p> <p>Op. 3. IX. 91. Totalexstirpation in übl. Weise; ohne Schwierigkeit vollständ. Verschluss der Wunde.</p> <p>Heilverlauf gut.</p>                                                                                                              | 22. IX. 91 geheilt.                | Bis heute vollstrecidivfrei. (Wohlbefinden.)                                  |
| c. cerv.       | <p>Op. 30. IX. 91. Sehr schwierig. Combination der Freund'schen Methode mit vag. Meth.</p> <p>Verschluss der Wunde.</p>                                                                                                                                                               | 23. X. 91 geheilt.                 | <p>12. I. 97. Links in der Narbe Recidiv.</p> <p>† 17. XI. 92 an Recidiv.</p> |
| c. port. vag.  | <p>Op. 14. I. 92. Totalexstirpation ziemlich leicht anzuführen. Perit. und Scheidenwand völlig geschlossen.</p>                                                                                                                                                                       | † 23. I. 92, Eiterige Peritonitis. | † nach neun Tagen. Peritonitis.                                               |
| c. corp. teri. | <p>Op. 16. II. 92. Ulcerierten Parteen mit dem scharfen Löffel entfernt.</p> <p>Ausspülung mit 5% Carbollösung. Die weitere Op. in typ. Weise ohne besondere Schwierigkeiten. Umschneiden der Neubildung in grosser Ausdehnung. Scheidenwunde bleibt offen; Jodoformgazetampnade.</p> | 12. III. geheilt.                  | Heilung von Dauer. Zur Zeit noch recidivfrei. (10. XII. 97 untersucht).       |

| Name,<br>Alter           | Menses                         | Geburten<br>nor-<br>male        | Fehl-<br>geb. | Beschwerden. Dauer des Leiden.<br>Etwaige vorherige Behandlung Bef.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29) Ki. M.<br>33 J. alt. | Seit 16. Jahre<br>regelmässig. | IV                              | —             | Seit 5 Mon. Blutabgang. Drang<br>Wasserlassen.<br><br>J. U.: An Stelle der Port. gross<br>mit jauchigen Zerfallsprodukten<br>deckte, ulcerierende Fläche, deren<br>gebung hart infiltriert ist. Lippen<br>Muttermund nicht zu unterscheiden<br>Neubildung geht rechts vorne und<br>ten oben auf das Scheidengewölbe<br>nach links reicht sie ebenfalls bis z<br>Scheidenwand. Cervix verdickt. U<br>nicht vergrössert, frei bewegl. Tub<br>und Ovarien normal. Parametr. voll<br>frei von Infiltration; nur scheint d<br>linke etwas verdickt, aber keine Knot<br>oder feste Stränge nachweisbar.                                |
| 30) R. M.<br>31 J. alt.  | Seit 15. Jahre<br>regelmässig. | IV<br>letzte<br>vor 12<br>Woch. | —             | Seit der letzten Entbindung stets Bl<br>abgang. Seit 8 Tagen Kreuzschme<br>Mattigkeit.<br><br>J. U.: Port. grosse ulcerierende Fläc<br>mit hart infiltrierten Rändern, mit ja<br>chigen leicht blutenden Massen bedec<br>Ulceration greift links vorne u. hint<br>auf die Scheide über. Muttermund<br>Cervikalkanal nicht aufzufinden. Cer<br>hart infiltriert, stark verdickt. Corp.<br>vergr. scharf retrofl., gut bewegl. Be<br>Herabziehen spannt sich das linke l<br>recto-uterinum stark an. Parametr<br>frei; linkes etwas verdickt. Car<br>nomatöse Stellen lassen sich ab<br>trotzdem nicht nachweisen. Ovar<br>normal. |
| 31) An.K.<br>73 J. alt.  | Menopause<br>im 48. J.         | —                               | —             | Seit 3 Jahren blutige Ausscheidung<br>seit 2 Mon. beständiger Blutaussflu<br>In letzter Zeit starker Marasmus.<br><br>J. U.: Port. völlig atroph. Aus d<br>Muttermund entleert sich fortwähre<br>Blut. Corp. ut. gross (8 cm) anteve<br>weich, bewegl. Sonde dringt an der hi<br>Fläche in weiche Massen. Tuben<br>Bänder normal, Ovar. atroph.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Diagnose       | Operation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unmittelbarer Erfolg        | Weiterer Verlauf.                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| re. port. vag. | <p>18. II. 92. Die verjauchten Massen mit dem scharfen Löffel entfernt.</p> <p>19. II. Totalexstirpation ohne besond. Schwierigkeit. Die unteren Partien des lig. lat. verdächtig. Unterbindungen werden möglichst weit weg von der Cervix gelegt. Scheidenwunde in der Mitte offen. Jodoformgazestreifen in die Bauchhöhle, Tampon. der Scheide.</p> | <p>10. III. 92 geheilt.</p> | <p>Juli 92 Recidiv.</p> <p>† 23. II. 93 an Recidiv.</p>                 |
| re. cerv.      | <p>Op. 4. III. 92.</p> <p>Entfernung der zerfallenen Massen mit scharfem Löffel. Ausspülung. Exstirp. in üblicher Weise. Abbindung des link. lig. lat. dicht am Carcinom. Aus dem Abdomen entleert sich eine grosse Menge seröser Flüssigkeit. Wunde bleibt in der Mitte offen. Jodoformgazetampon. Wundverlauf gut.</p>                              | <p>23. III. 92 geheilt.</p> | <p>19. VII. 92 an Recidiv behandelt.</p> <p>† 5. II. 93 an Recidiv.</p> |
| re. adenom.    | <p>Nachdem am 26. III. 92 vorsichtig die Mucosa ut. excochleirt u. mikroskopisch ein Carc. adenomat. festgestellt wurde, erfolgt am 28. III. Totalexstirpation in üblicher Weise ohne besondere Schwierigkeit. Die atroph. Tuben u. Ovarien werden zurückgelassen. Scheidenwunde in der Mitte offen; Tamp.</p>                                        | <p>26. IV. 92 geheilt.</p>  | <p>Bis heute gesund u. recidivfrei.</p>                                 |

| Name,<br>Alter           | Menses                                        | Geburten<br>nor-<br>male          | Fehl-<br>geb. | Beschwerden. Dauer des Leidens.<br>Etwaige vorherige Behandlung. Befund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32) Fi. E.<br>48 J. alt. | Seit 14. Jahre<br>regelmässig<br>bis vor 3 J. | I                                 | —             | Seit 2 Jahren Blutung; seit $\frac{1}{2}$ J. fl.<br>albus.<br>J. U.: Port. klein, nach hinten gerichtet<br>mit seitlichen Einrissen. Muttermund<br>bequem für 1 Finger durchgängig, eben<br>Cervix. Oberhalb des Muttermundes<br>weiche, bröckelige, leicht unter Blutung<br>zerdrückbare Massen, welche das ganze<br>Endometr. erfüllen. Corp. sehr gross<br>anteil. nach rechts verlagert, hart, un-<br>beweglich. Tuben u. Parametrien frei.<br>Linkes Ovar. vergrössert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 33) Ko. K.<br>34 J. alt. | Seit 16. Jahre<br>regelmässig.                | VI<br>4 Kin-<br>der tot<br>gebor. | —             | Seit $\frac{1}{2}$ Jahre Blutungen.<br>Ueber Verhältnisse des Genitaltraktes<br>konnte leider nichts in Erfahrung ge-<br>bracht werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 34) Lu. J.<br>44 J. alt. | Seit 17. Jahre<br>regelmässig.                | VI                                | —             | Seit 4 Monaten starke Blutungen ver-<br>bunden mit Kreuzschmerz.<br>J. U.: Portio verdickt. An Stelle des<br>Muttermundes ein tiefes, knotenförmiges<br>Geschwür mit jauchigen, unregelmässigen,<br>zerfressenen Rändern, die von harten<br>Infiltrationen umgeben sind. Cervix<br>stark verdickt, Corp. normal gross<br>retrovertiert, leicht aufzurichten und<br>herabzuschieben. Linkes Parametrium<br>vollständig frei, rechtes spannt sich bei<br>Tieferziehen in deutlichen Strängen<br>enthält aber keine knolligen Auftre-<br>bungen. Ovarien u. Tuben ganz nor-<br>mal. Da am 10. XII. 92 Pat. starke<br>Blutabgang hatte u. man bei der Un-<br>tersuchung wahrnahm, dass das Blut<br>hoch herab aus der Cervix rieselte, so<br>wurde mit dem ferr. cand. eine grüne-<br>liche Verschorfung vorgenommen, wor-<br>auf Blutung stand. |

| Diagnose         | Operation                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unmittelbarer Erfolg             | Weiterer Verlauf.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c. corp.<br>ut.  | <p>Op. 20. VII. 92.<br/>Unterbindung der ligg. latt. sehr schwierig wegen der Grösse des Ut. Nach vergeblichen Versuchen gelingt es endlich, den Ut. vom Rect. aus umzustülpen. Beim Anziehen läuft stets jauchige Brühe aus der Cervix. Scheidenwunde in der Mitte offen; Jodoformgazetamp.</p>                     | <p>11. VIII. 92<br/>geheilt.</p> | <p>22. IX. 92<br/>Untersuchung in der Klinik. Recidiv wird nicht nachgewiesen.<br/>† 15. I. 98 an Recidiv.<br/>Sektion ergibt: Im Beckeneingang Kindskopfgr. carcin. Tumor. An der Wirbelsäule eine Kette kleinerer Tumoren. Pankreas in einen gr. carc. Tumor verwandelt.</p> |
| c. port.<br>vag. | <p>Op. 1. XI. 92.<br/>Zunächst Entfernung der Hauptmasse des Carc. mit scharfem Löffel. Verschorfung. Dann Exstirpat. in üblicher Weise ohne besondere Schwierigkeit. Wunde in der Mitte offen, mit Jodoformgazetamp.</p>                                                                                            | <p>Geheilt.</p>                  | <p>Bis zur Zeit völlig gesund. Recidivfrei.</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| c. cerv.         | <p>Op. 14. XII. 92.<br/>Verschorfung der Carcinomhöhle. Exstirp. in typischer Weise. Beide Tuben u. Ovarien bleiben zurück. Wegen des verdächtigen Stranges rechts wird der Stumpf nochmals angezogen u. mehrere Nadeln weit nach hinten u. seitlich gelegt. Das abgeschnürte Stück mit dem Paquelin verschorft.</p> | <p>8. I. 93<br/>geheilt.</p>     | <p>Mai 93 noch recidivfrei. Nov. 93 Recidiv.<br/>† 12. V. 94 an Recidiv.</p>                                                                                                                                                                                                   |

| Name,<br>Alter             | Menses                                                       | Geburten<br>nor-<br>male | Fehl-<br>geb.         | Beschwerden. Dauer des Leidens<br>Etwaige vorherige Behandlung. Befund                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35) Sch. B.<br>42 J. alt.  | Seit 17. Jahre<br>regelmässig.                               | VII                      | —                     | Seit 8 Wochen Blutungen. Keine Schmerzen.<br>J. U.: An Stelle der Port. ein die vordere Lippe einnehmendes, an der Oberfläche stark jauchiges, carcinomartiges Geschwür. Hintere Lippe gesund. Cervix klein, frei beweglich. Rechte Anhängelike frei; im linken Paramet. einige dicke Stränge. Carc. greift nicht auf die Scheide über.                    |
| 36) Wu. Chr.<br>31 J. alt. | Seit dem 18. J.<br>unregelm.                                 | V                        | —                     | Seit 2 Monaten anhaltende Blutungen ohne Schmerzen.<br>J. U.: Vagina glatt, weit. Im vorderen Scheidengewölbe pilzartige, höckerförmige gegen die Scheide sich abhebende Geschwulst, von der vorderen Lippe ausgehend.<br>Deutliche Infiltration in den Parametrien nicht vorhanden; höchstens rechts einige kleine Knötchen. Anhängelike und Bänder frei. |
| 37) Bau. M.                | —                                                            | —                        | —                     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 38) Däu. K.                | Seit 12. Jahre<br>regelmässig.                               | III                      | —                     | Seit 3 Monaten Blutung und eiteriger Ausfluss.<br>J. Befund fehlt.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 39) Ru. F.<br>52 J. alt.   | —                                                            | —                        | —                     | Anamnese und Befund fehlt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 40) Kü. A.<br>66 J. alt.   | Seit 15. Jahre<br>regelmässig,<br>Menopause<br>im 51. Jahre. | I                        | I vor<br>34<br>Jahren | Seit Mai 93 Blutungen. Eiteriger Ausfluss. Schlaflosigkeit. Abmagerung.<br>J. B.: Port. in einen derben, höckerigen Tumor verwandelt, der im wesentlichen der vorderen Lippe angehängt. Beim Eingehen in die Cervix fühlt man krümelige, leicht abreissbare Massen. Corp. ut. atroph., normal gelagert. Anhängelike und Parametrien frei.                  |

| nose     | Operation                                                                                                                                        | Unmittelbarer Erfolg                  | Weiterer Verlauf.                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| port. g. | 28. I. 93. Verschorfung des Carc. Extirpation ohne Schwierigkeit. An den verdächtigen Stellen Abtragung weit entfernt. Verschorfung der Stümpfe. | Geheilt entlassen.                    | Zur Zeit völliges Wohlbefinden. Recidivfrei.                         |
| port. g. | Op. 27. IV. 93 in typischer Weise.                                                                                                               | 3. V. 93. Exitus letalis Peritonitis. | † an Peritonitis post op.                                            |
| cerv.    | —                                                                                                                                                | —                                     | † 14. I. 94.                                                         |
| cerv.    | 19. V. 93. Operation ohne besondere Schwierigkeit in typischer Weise.                                                                            | 9. VI. geheilt.                       | † 29. III. 95. Todesursache Recidiv. Juli 93 Recidiv in der Scheide. |
| corp. t. | Op. 31. V. 93. Operation ziemlich mühsam. Wunde in der Mitte offen. Jodoformgazetamp.                                                            | 25. VI. geheilt.                      | † Nov. 93 an Verblutung nach Operat. eines Mammacarcinoms.           |
| cerv.    | Op. 6. VII. 93. Operation ohne Schwierigkeit in üblicher Weise. Wunde total geschlossen.                                                         | 23. VII. geheilt.                     | † 20. V. 96. Todesursache unbekannt.                                 |

| Name,<br>Alter             | Menses                                                       | Geburten<br>nor-<br>male                                                              | Fehl-<br>geb. | Beschwerden. Dauer des Leidens.<br>Etwaige vorherige Behandlung. Befund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41) Laut. B.<br>48 J. alt. | Seit 18. Jahre<br>unregelm.                                  | III                                                                                   | —             | Seit August 93 Blutungen, die eine<br>Zeit lang aussetzten, aber im Oktober<br>wiederkehrten. Kreuzschmerzen.<br>J. U.: Port. verlängert. Gegend d.<br>äusseren Mm. ersetzt durch einen d.<br>ben, höckerigen Tumor mit wulstigen<br>Rändern, leicht blutend. Tumor greift<br>nicht auf die Scheide über. Corp. ut.<br>nur wenig vergrössert, nicht schmerzhaft.<br>Anhänge normal. Parametrium frei.<br>Ligg. recto-uterina verdickt, doch<br>keine Knoten wahrnehmbar.                                                                                                      |
| 42) Ke. M.<br>43 J. alt.   | Seit 17. Jahre<br>regelmässig.                               | II<br>Nach<br>d. 1.<br>Entb. 8<br>Woch.<br>an Pu-<br>erperal-<br>fieber er-<br>krankt | —             | Seit 2 Monaten heftige Blutungen<br>Schwäche.<br>J. U.: Corp. normal, beweglich. Rectum<br>im Param. derber, harter Strang, doch<br>nicht bis ans Becken reichend. Port.<br>in einen pilzförmigen, zerklüfteten<br>Tumor verwandelt. Ovarium rechts<br>grösser als links.<br>Sonst Anhänge u. Ligg. recto-uterina<br>normal.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 43) He. S.<br>53 J. alt.   | Seit 18. Jahre<br>regelmässig.<br>Menopause<br>im 44. Jahre. | IV                                                                                    | —             | Seit $\frac{3}{4}$ Jahren Blutungen u. Schmerzen<br>im Unterleib.<br>J. U.: Corp. ut. klein, atroph., leicht<br>beweglich. Vorderes u. hinteres Schen-<br>dengewölbe geht in einen Trichter mit<br>wallartigen Rändern über, der nach<br>oben hin enger wird. Die Innenfläche<br>des Trichters, welche die atroph. Cervix<br>darstellt, höckerig u. leicht blutend.<br>Auf der rechten Seite geht direkt v.<br>Carc. aus ein etwa Ballbleistift dicke<br>Strang nach hinten, dem Lig. recto-<br>uterin. entsprechend; ein ähnlicher<br>was dünnerer von der linken Seite aus. |
| 44) Teu. B.<br>38 J. alt.  | Seit 15. Jahre<br>regelmässig.                               | III                                                                                   | —             | Seit 10 Wochen Abgang von dickfl.<br>sigem Blut. Keine Schmerzen.<br>J. U.: Ut. etwas vergrössert, nicht<br>schmerzhaft. Muttermund quergespal-<br>ten. Vordere Lippe überragt die hintere<br>deutlich. Ausserdem fühlt sie sich<br>dick u. derb an, blutet bei der Berüh-<br>rung nicht unerheblich. Bei der Unter-<br>sichtigung mit dem Speculum gewahrt<br>sie eine Erosion ähnliches Aussehen.<br>Ovarien nicht vergrössert. Tuben<br>Mutterbänder ohne Befund.                                                                                                          |

| agnose.               | Operation                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unmittelbarer Erfolg                                      | Weiterer Verlauf.                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e. port. vag.         | Op. 23. X. 93.<br>Totalexstirpation in typischer Weise ohne besondere Schwierigkeit. Einige Zeit post op. Puls rasch u. schwach. Anämie. Diagnose auf innere Blutung. Laparatomie. In den linken Anhängen war eine Ligatur abgeglitten. Unterbindung. Kochsalzinfusionen. Abends Collaps. | † 23. X. 93. Verblutung.                                  | †.                                                                                                                                            |
| e. port. vag.         | Op. 7. XI. 93.<br>Nach Verschorfung des Carc. Operation in üblicher Weise ohne Schwierigkeit. Parametrien werden weit mit herausgenommen. Wunde in der Mitte offen. Jodoformgazetamp.                                                                                                     | 25. XI. 93 geheilt.                                       | † 18. XII. 94 an Marasmus. 2—3 Mon. post op. grosses Carcinom der Vagina auf die Blase übergreifend.                                          |
| e. cerv.              | Op. 6. XII. 93<br>ohne besondere Schwierigkeit in üblicher Weise. Rechte u. linke Anhänge entfernt. Abbindung der Parametrien. Wunde in der Mitte offen. Jodoformgazetamp.                                                                                                                | 23. XII. entlassen mit gut granulierender Wunde. Geheilt. | Zur Zeit völlig gesund. Recidivfrei.                                                                                                          |
| e. port. ag. et cerv. | 12. IX. 93 Amputation der vorderen Lippe. Excision aus der hint. Carcinom. 16. IX. Totalexstirpation ohne Zwischenfall. Teilweise Vernähung der Scheide. Glatter Wundverlauf.                                                                                                             | 30. XI. geheilt.                                          | Nach 3 Monate verdächtig. April 94 Recidiv. Keine Beschwerden. † 2. I. 96 an Carcinomrecidiv. Blasen-scheiden-fistel, Hydro-nephrose, Urämie. |

| Name,<br>Alter                | Menses                                                                          | Geburten<br>nor-<br>male | Fehl-<br>geb. | Beschwerden. Dauer des Leidens.<br>Etwaige vorherige Behandlung. Befund                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45) Schm.<br>D.<br>36 J. alt. | Seit dem 16. J.<br>regelmässig.                                                 | VI                       | —             | Seit 6 Monaten starke Blutungen, unregelmässig. Keine Schmerzen.<br>Befund: Stark vergrösserte Portio in einen derben Tumor verwandelt, der auf beide Lippen, namentlich die hintere, übergegangen ist. Corp. etwas vergrössert, sehr beweglich. Ovarien nichts besonderes. Parametrien werden frei erfunden.                                                                        |
| 46) Je. M.<br>53 J. alt.      | Seit 17. Jahre<br>regelmässig,<br>in letzter Zeit<br>oft lange aus-<br>setzend. | I<br>vor 2.<br>Jahren    | —             | In letzten Wochen zuweilen Leibscher-<br>zen. Abgang geronnenen Blutes.<br>Wasserdrang.<br>J. U.: Portio normal gross, Muttermund für 1 Finger durchgängig. Cervikal-<br>schleimhaut glatt. Corpus antevertiert<br>normal gross, gut beweglich.<br>Mikroskopische Untersuchung der aus-<br>gekratzten Schleimhaut ergibt Carcinom                                                    |
| 47) Nü. M.<br>39 J. alt.      | Seit 15. Jahre<br>regelmässig.                                                  | V                        | —             | Seit 2 Monaten starke Blutungen.<br>J. U.: Portio, besonders hintere Lippe in einen blumenkohlartigen, an der Oberfläche leicht zerfallenen, sonst harten Tumor umgewandelt. Cervix teilweise durchgängig. Corp. normal gross retrofl. Parametrien frei; doch gelte rechts eine halbbleistiftdicke, leicht verschiebbliche Resistenz bis in die Nähe des Beckens.<br>Ovarien normal. |
| 48) Mey. M.<br>41 J. alt.     | Seit dem 15. J.<br>regelmässig.                                                 | X<br>2 mal<br>Zwillinge  | —             | Seit 14 Tagen blutiger, übelriechender Ausfluss.<br>J. U.: Aus der in einen tiefen Trichter umgewandelten Portio blutig-eitriger Ausfluss. Corpus beweglich, etwas vergrössert. Douglas'sche Falten beiderseits etwas gespannt und verdickt. Knollen nicht fühlbar.<br>Rechtes Ov. derb u. höckerig, C. klein atroph.                                                                |
| 49) Hoe. El.<br>38 J. alt.    | Seit dem 15. J.<br>regelmässig.                                                 | V                        | —             | Schmerzen im Kreuz u. Unterleib. Dunkler blutiger Ausfluss seit 4 Monaten.<br>J. U.: Port. in einen zerklüfteten, leicht blutenden Tumor verwandelt. Corp. retrovert., normal gross. Parametrien und Anhänge frei.<br>Rechte Douglas-Falte in ganzer Ausdehnung als verdickter Strang zu fühlen                                                                                      |

| Diagnose     | Operation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unmittelbarer Erfolg                                                                               | Weiterer Verlauf.                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| port.        | 22. I. 94. Auskratzung u. Verschörfung der carcinomat. Massen.<br>Totalexstirpation ohne besond. Schwierigkeit, doch zeigt sich, dass das Carc. in Form einer plattenartigen Verdickung ins Parametr. hineinragt. Es gelingt jedoch, jenseits d. Verdickung abzutragen. Untersuchung des Parametr. am Ut. ergibt carcinomat. Infiltration.<br>Prognose zweifelhaft, da wahrscheinl. Carcinomreste zurückgeblieben. | 13. II. 94 entlassen.<br>Im rechten Wundwinkel leicht blutende Stelle, Umgebung nicht infiltriert. | 4. I. 95 Recidiv.<br>† 20. VIII. 95.         |
| corp.        | 27. I. 94. Operation ohne besonderen Zwischenfall. Ovarien bleiben zurück. Wunde in der Mitte 2 cm offen; Jodoformgazetamp.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13. II. 94 entlassen.<br>Wunde granulierend.                                                       | 27. XI. 95 Recidiv.<br>† 23. VIII. 96.       |
| cerv.        | 12. II. 94. Operation ohne besondere Schwierigkeit. Abbindung der Parametrien weit vom Ut. entfernt. Ovarien zurückgelassen. Wunde in der Mitte etwas offen, tamp. mit Jodoformgaze.                                                                                                                                                                                                                               | 10. III. 94 entlassen.<br>Wohl befinden.                                                           | 11. XII. 97 Recidivfrei.                     |
| cerv.        | 18. IV. Totalexstirpation in üblicher Weise. Scheide gegen die Bauchhöhle bis auf eine kleine Öffnung geschlossen. Jodoformgazetamp.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5. V. 94 geheilt entlassen.                                                                        | Ueberweitem Verlauf war nichts zu ermitteln. |
| port.<br>ag. | 9. V. 94. Operation macht keine besondere Schwierigkeiten. Peritonealhöhle in der Mitte offen u. mit Jodoformgaze tamponiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26. V. entl. Geheilt.<br>Ränder der Narbe hart und derb.                                           | 12. XII. 97 Wohl befinden.<br>Recidivfrei.   |

| Name<br>Alter                               | Menses                                                        | Geburten<br>nor-<br>male | Fehl-<br>geb. | Beschwerden. Dauer des Leidens<br>Etwaige vorherige Behandlung. Befund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50) Eh. B.<br>51 J. alt.                    | Seit dem 14. J.<br>regelmässig,<br>mit Krämpfen<br>verbunden. | VII                      | —             | Seit einigen Monaten unregelmässige<br>Blutungen. In letzter Zeit überreichlicher<br>der Ausfluss. Abmagerung, Verstopfung.<br>Portio kurz; Cervikalkanal enthält eine<br>fallene, stark überreichliche Krebsmasse.<br>Corp. ut. retrovertiert, gut beweglich.<br>Im linken Parametr. gleichmässig infiltrierter<br>dünner Strang. R. P. ohne Befund.<br>Anhänge ohne bes. Befund.                                                     |
| 51) Eng.<br>Fr. 19.—40. Jahre<br>43 J. alt. | Menses vom<br>regelmässig,<br>in letzter Zeit<br>nicht mehr.  | III                      | —             | Seit 9 Monaten Blutung, mitunter Ausfluss.<br>Ohrensausen, Schwindel, Abmagerung.<br>J. U.: Portio in einen ziemlich harten<br>höckerigen Tumor verwandelt, von der vord.<br>Lippe ausgehend. Ut. ziemlich gross, beweglich.<br>Rechtes Parametr. u. Douglas normal.<br>Linker Douglas in ganzer Ausdehnung<br>verdickt. In der Gegend des Ileo-sacralen<br>Gelenkes eine kirschengrosse, mit der<br>Unterlage verwachsene Lymphdrüse. |
| 52) Gei. L.<br>51 J. alt.                   | Seit dem 16. J.<br>regelmässig.<br>Menopause<br>im 49. Jahre. | —                        | —             | Seit 1/2 Jahr sehr reichl. blutig-seröser<br>Ausfluss. Dabei heftige Leibscherzen.<br>Befund: Abdomen stark ausgedehnt<br>durch einen nicht ganz bis zum Nabel<br>reichenden Tumor, welcher als der vergrösserte<br>Ut. anzusehen ist. Portio kurz,<br>virginell, zapfenförmig. Ueberreichliches<br>eitrige Sekret.                                                                                                                    |
| 53) He. A.<br>51 J. alt.                    | Seit 13. Jahre<br>regelmässig.<br>Menopause<br>mit 49 Jahren. | —                        | —             | Seit 1 Jahr stärkere Ausdehnung des<br>Leibes. Vor 6 Wochen 8 Tage lang<br>dauernde Blutung. Kreuzschmerzen.<br>J. U.: Portio vollständig verstrichen.<br>Corp. ut. in einen über kindskopfgrossen<br>derben Tumor verwandelt, mit glatter<br>Oberfläche, nach oben bis beinahe zum<br>Nabel reichend.<br>Anhänge ohne besonderen Befund.                                                                                              |

| Diagnose            | Operation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unmittelbarer Erfolg                                                                                                                                                                    | Weiterer Verlauf.                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| rc. cerv.           | 24. V. 94. Auskratzung u. Verschörfung der Krebsmassen. Vordere u. hintere Muttermundslippe aneinander genäht. Abbinden des linken Paramet. weit entfernt vom Ut. Linkes Ovarium zurückgelassen. Scheidenwunde in der Mitte offen. Jodoformgazetamp.                                                                                                    | 17. VI. Entlassung. Urinabgang durch die Scheide. Sonst Wohlbefinden.                                                                                                                   | 94 Fistel geheilt.<br>10. XII. 97 gesund u. recidivfrei. |
| rc. cerv.           | 29. V. 94. Operation in üblicher Weise ohne besondere Schwierigkeit. Periton. offen; Jodoformgazetamp.                                                                                                                                                                                                                                                  | 22. VI. Entlassung. Untersuchung per rectum: Rechts gleichmässig verdickter Strang, nicht bis zum Becken. Links bleistift-dicker Strang bis ans Becken. Die erw. Lymphdrüse vergrößert. | 9. XII. 97 gesund u. recidivfrei (bei schwerer Arbeit).  |
| rc. corp. ut.       | 9. VI. 94. Totalexstirpation per vag. begonnen; wegen zu heftiger Blutungen per Laparatomiam beendet. Da aus den Tuben sich Eiter in die Bauchhöhle ergoss, bleibt die Wunde offen u. der ganze Trichter bis in die Scheide mit Jodoformgaze drainiert.                                                                                                 | 10. VI. Puls klein und beschleunigt. † unter den Zeichen von Herzschwäche.                                                                                                              | † post op.                                               |
| rc. et yoma rp. ut. | 30. VIII. 94 Laparatomie; mit ziemlich bedeutenden Schwierigkeiten verknüpft. Wegen des verjauchten Inhalts der Uterushöhle muss von der Totalexstirpation des Ut. von der Bauchhöhle aus abgesehen werden. Collum ut. wird mit einem Gummischlauch abgeschnürt, das corp. ut. abgesetzt. Cervixhöhle verschorft, dann vernäht. Bauchwunde geschlossen. | 20. IX. † an diffuser eitr. Peritonitis.                                                                                                                                                | † post op.                                               |

| Name,<br>Alter                | Menses                                                                         | Geburten<br>nor-<br>male       | Fehl-<br>geb. | Beschwerden. Dauer des Leidens.<br>Etwaige vorherige Behandlung. Befund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54) Zi. Th.<br>63 J. alt.     | Seit dem 18. J.<br>regelmässig.<br>Menopause<br>mit 48 Jahren.                 | II                             | —             | Seit 5 Wochen Abgang geronnenen<br>Blutes, übelriechend.<br>J. U.: Portio in einen zerklüfteten, leicht<br>blutenden Tumor verwandelt. Corp. ut.<br>normal gross, gut beweglich. Bei<br>Rectaluntersuchung fühlt man vom Cer-<br>vix abgehend nach links hinten einen<br>bleistiftdicken gleichmässigen Strang.<br>Im übrigen sind die Parametrien frei.                                                                                                                                                                                 |
| 55) Am. M.<br>37 J. alt.      | Seit dem 14. J.<br>regelmässig.                                                | IX<br>einmal<br>Zwil-<br>linge | —             | Seit einigen Monaten unregelmässige<br>Blutungen, hie u. da weisser Ausfluss.<br>Keine Schmerzen.<br>J. U.: Von der vorderen Muttermund-<br>lippe hat sich ein blumenkohlartiger<br>fast die ganze Scheide ausfüllender, leicht<br>zerfallener und blutender Tumor ent-<br>wickelt. Hintere Lippe grösstenteils<br>gesund. Corp. ut. normal gross, ante-<br>flectiert. Nach rechts geht im Para-<br>metrium ein ganz dünner, gleichmässig<br>infiltrierter Strang nicht ganz bis zum<br>Becken herüber.<br>Anhänge ohne abnormen Befund. |
| 56) Brei.<br>K.<br>56 J. alt. | Seit dem 14. J.<br>regelmässig.<br>Menopause<br>im 42. Jahre.                  | VII                            | 1             | Blutungen seit 1 Jahr; sehr stark.<br>J. U.: Portio verkürzt; Muttermund<br>quergespalten, für die Fingerkuppe<br>durchgängig. Corp. ut. vergrössert, weich,<br>beweglich. Aus dem Ut. entleert sich<br>blutig-eitriger, übelriechender Ausfluss.<br>2. V. 95. Auskratzung.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 57) Bez. L.<br>48 J. alt.     | Regelmässig.<br>Seit dem 16. J.<br>regelmässig.<br>Menopause<br>mit 48 Jahren. | ?                              | —             | Seit 3 Mon. unregelmässige Blutungen,<br>zuweilen Schmerzen.<br>J. U.: Ut. nicht vergrössert, beweglich.<br>Portio zerklüftet durch einen von der<br>Cervikalschleimhaut ausgehenden, mäs-<br>sig derben, höckerigen, bei der Berüh-<br>rung leicht blutenden Tumor, welcher<br>sich ziemlich weit nach links herüber-<br>erstreckt. Auf der linken Seite erscheint<br>das Parametr. kürzer als rechts, etwa<br>verdickt, ohne dass man knollige Ver-<br>dickungen fühlen kann.                                                          |

| agnose         | Operation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unmittelbarer Erfolg                                                                                           | Weiterer Verlauf.                                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| re. cerv.      | 14. IX. 94 Totalexstirpation per vag. Das Carc. geht nahe an die Blase heran u. hat auf beide Parametrien, bes. nach links übergegriffen. Bei dem Versuch, den Ut. zu invertieren, reisst die dünne Wand u. es entleert sich jauchiger Eiter. Links bleibt Tube u. Ovarium zurück, rechts wird die knollig angeschwollene Tube entfernt. Wunde u. Scheide mit Jodoformgaze tamponiert. | 5. X. Entlassen: Keine besond. Beschwerden, doch in der granulierenden Wunde eine carcinom-verdächtige Stelle. | 8. VIII. 96 Carcinoma recidiv. parametriorum utriusque et vag. ant.<br>† 11. XII. 96 Recidiv. |
| re. port. vag. | 5. XI. 94. Totalexstirpation ohne bes. Schwierigkeit. Beide Tuben u. Ovarien zurückgelassen. Wunde in der Mitte offen, mit Jodoformgaze tamponiert.                                                                                                                                                                                                                                    | 24. XI. 94 geheilt entlassen.                                                                                  | 11. XII. 97. Keine Symptome. Recidivfrei.                                                     |
| re. corp. ut.  | 4. V. 95. Totalexstirpation in üblicher Weise. Links bleibt Tube u. Ovarium zurück. Wunde in der Mitte offen. Parametrien sind frei. An der hinteren Uteruswand taubeneigrosser zerklüfteter Tumor; ferner 2 kleine etwa bohnen-grosse Erhabenheiten, die sich als nicht bösartige Adenome erweisen.                                                                                   | 26. V. 95 Entlassung geheilt.                                                                                  | 11. XII. 97 recidivfrei.                                                                      |
| re. cerv.      | 29. V. Operation ohne irgendwelche Komplikation. Drainage der Wunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19. VI. 95 geheilt.                                                                                            | 14. XII. 97 recidivfrei.                                                                      |

| Name,<br>Alter                 | Menses                                                   | Geburten<br>nor-<br>male             | Fehl-<br>geb. | Beschwerden. Dauer des Leidens.<br>Etwaige vorherige Behandlung. Befund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58) Wei.M.<br>49 J. alt.       | Seit 16. Jahre<br>regelmässig,<br>Menopause<br>mit 48 J. | I<br>im 41.<br>Jahre<br>(Zan-<br>ge) | —             | Kreuzschmerzen; starker blutiger Aus-<br>fluss.<br>Ut. beweglich, weich, vergrössert.<br>Parametrien frei, ohne jegl. Infiltration.<br>15. VI. 94. Probeauskratzung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 59) Frie.M.<br>39 J. alt.      | Regelmässig.<br>1. Menstruat.<br>mit 10 Jahren.          | IX                                   | I             | Vor 4 Wochen starke Blutung nach<br>schwerer Arbeit. Pat. fühlt sich sehr<br>schwach.<br>Ut. vergrössert, derb, retrovertiert. Von<br>der vorderen Muttermundslippe fühlt<br>man einen in die Scheide ragenden<br>ziemlich derben, zerklüfteten Tumor.<br>bei Berührung blutend, wallnussgross.<br>Parametrien erscheinen frei.                                                                                                                                      |
| 60) Schr.<br>Fr.<br>63 J. alt. | Menopause<br>seit 13 J.                                  | IV                                   | —             | Seit 1½ J. übelriechender, blutig wä-<br>ssriger Ausfluss.<br>J. U.: Am äussern Muttermund ziem-<br>lich derbes, bei Berührung blutende<br>zerklüftetes Geschwür, dessen Ränder<br>gewulstet sind. Ut. klein, beweglich.<br>Parametrien frei.<br>Anhänge nichts Besonderes.                                                                                                                                                                                          |
| 61) Kö.M.<br>42 J. alt.        | Seit 14. Jahre<br>regelmässig                            | II                                   | —             | Blutungen seit einigen Monaten, beson-<br>ders zur Zeit der Menses. Frostgefühl.<br>J. U.: Ut. mässig vergrössert, beweglich.<br>liegt etwas nach rechts. Portio ver-<br>kürzt, cylindrisch. Muttermund quer<br>gespalten. Von der hinteren Mutte-<br>mundslippe geht ein über wallnus-<br>grosser, bei der Berührung blutender<br>Tumor mit höckeriger Oberfläche und<br>ziemlich weicher Consistenz ziemlich<br>breit gestielt ab.<br>Parametrien u. Anhänge frei. |

| Prognose     | Operation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unmittelbarer Erfolg                                                                                           | Weiterer Verlauf.                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| e. corp. ut. | <p>18. VI. 95. Totalexstirpation in üblicher Weise ohne besondere Schwierigkeit. Wunde in der Mitte offen; Jodoformgaze.</p> <p>Im aufgeschnittenen Uterus 2 welsch-nussgrosse, durch intakte Schleimhaut getrennte Carcinomknoten. Uteruswand am Fundus lässt zerfallenes Carcinomgewebe aus seinen Lymphgefässen herausdrücken. Periton. intakt. Parametrien erscheinen bei mikroskopischer Untersuchung zweifelhaft.</p> | <p>6. VI. 95. Wohlbefinden. Entlassung.</p>                                                                    | <p>9. XII. 97. Recidivfrei.</p>                 |
| e. cerv.     | <p>4. VII. 95 Totalexstirpation in üblicher Weise. Jodoformgaze in den in der Mitte befindlichen Schlitz.</p> <p>Vor der Operation Auskratzung und Verschorfung der carcinomat. Massen.</p>                                                                                                                                                                                                                                 | <p>24. VII. geheilt.</p>                                                                                       | <p>Ueber Pat. war nichts mehr zu ermitteln.</p> |
| e. cerv.     | <p>15. VII. 95. Totalexstirpation per vag. Zuvor Auskratzung u. Verschorfung des Carcinoms; alsdann die übl. Operation ohne besondere Schwierigkeit. Jodoformgaze in die Peritonealöffnung.</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p>29. VII. geheilt entlassen.</p>                                                                             | <p>13. XII. 97. Recidivfrei.</p>                |
| e. port.     | <p>28. VIII. 95. Abtragung des Tumors der hinteren Muttermundslippe, sowie der vorderen Muttermundslippe.</p> <p>31. VIII. Totalexstirpation glatt und ohne besondere Störung. Da eine Ligatur abgeleitet, wird eine Billrot'sche Klammer angelegt. Hinter derselben Seidenligatur, Unterbindung des Stumpfes. Jodoformgaze in den Wundschlitz.</p>                                                                         | <p>Nachblutung. Versuch von unten die Blutung zu stillen, misslingt. Laparotomie. Collaps. Exitus letalis.</p> | <p>† Verblutung.</p>                            |

| Name,<br>Alter                  | Menses                                                                   | Geburten     |               | Beschwerden. Dauer des Leidens.<br>Etwaige vorherige Behandlung. Befund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                          | nor-<br>male | Fehl-<br>geb. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 62) Do. B.<br>36 J. alt.        | Seit 14. Jahre<br>regelmässig.                                           | V            | —             | Seit $\frac{1}{4}$ Jahr blutiger Ausfluss, Schmer-<br>zen im Kreuz, Drängen nach unten.<br>J. U.: Ut. wenig vergrössert, nach unten<br>gelegen, schwer aufrichtbar. Portio<br>cylindrisch. Am Muttermund, bes.<br>der hinteren Lippe, eine derbe, bei<br>Berührung blutende, über die Oberfläche<br>nur wenig erhabene Verdickung, v.<br>leicht höckeriger Beschaffenheit.<br>Untersuchung eines excidierten Stü-<br>ckchens ergibt:<br>Carcinoma incipiens.<br>Parametrien frei. |
| 63) Hu.<br>Chr.<br>41 J. alt.   | Seit dem 14.<br>Jahre; an-<br>fangs regel-<br>mässig, spä-<br>ter nicht. | V            | 2             | Schmerzen im Kreuz und Ausfluss.<br>Portio nach vorn gerichtet. Muttermund<br>quergespalten. Portio im ganzen etw.<br>kolbig verdickt. Von der hintern Mu-<br>termundslippe geht ein derber, taube-<br>eigrosser Tumor ab, dessen Oberfläche<br>etwas höckerig ist, jedoch nicht zu-<br>fallen. Derselbe blutet leicht bei Be-<br>rührung. Corp. retroflect., etwas ver-<br>grössert, weich.<br>Parametrien und Anhängen frei.                                                    |
| 64) Schm.<br>Karol.<br>Alter ?  | Regelmässig.                                                             | I            | —             | Seit Wochen unregelmässige Blutungen,<br>keine Schmerzen.<br>J. U.: Ut. wenig vergrössert, Cervix<br>weich, verdickt. Muttermund für<br>Fingerspitze durchgängig. Im Cervix<br>Wucherung der Schleimhaut, carcinom-<br>atös.<br>Parametrien frei, ohne Infiltration.                                                                                                                                                                                                              |
| 65) Ste.<br>Marg.<br>52 J. alt. | Seit 18. Jahre<br>regelmässig.                                           | VII          | —             | Seit 6 Wochen Schmerzen im Le-<br>den, starke Blutungen, Verstopfung.<br>J. U.: An den Muttermundslippen fül-<br>man, besonders an der vorderen, einen<br>kleinen, derben, höckerigen, leicht be-<br>tenden Tumor. Cervix von höckerigen<br>Tumormassen erfüllt. Ut. klein, bewe-<br>gungsfähig, normal gelegen.<br>Parametrien frei.                                                                                                                                             |
| 66) Kai. A.<br>59 J. alt.       | 1. Menses mit<br>13 J., regel-<br>mässig.<br>Menopause<br>im 51. J.      | V            | —             | Vor 6 Tagen Abgang von Blut u.<br>Eiter, stark übelriechend; keine Schmer-<br>zen.<br>J. U.: Ut. klein, atrophisch. Cervix<br>einen kleinen, von höckerigen, leicht<br>blutenden und bröckeligen Massen<br>gefüllten Trichter verwandelt.<br>Parametrien rechts etwas infiltriert u.<br>verkürzt, links frei. Ovarien atrophisch.                                                                                                                                                 |

| Diagnose              | Operation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unmittelbarer Erfolg                                                       | Weiterer Verlauf.                                                                                                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c. uteri<br>ipiens.   | 27. I. 96. Totalexstirpation in üblicher Weise, Operation geht glatt von statten. Rechtes Ovarium bleibt zurück. In die Wunde Jodoformgaze.                                                                                                                                                                                                                                      | 14. II. geheilt.                                                           | 15. XII. recidivfrei.                                                                                                               |
| c. port.              | 19. V. Totalexstirpation in üblicher Weise. Ohne Störung und besondere Schwierigkeit. Linkes Ovarium in einen hühnereigrossen Tumor verwandelt, wird aber, da es die grosse Scheidenöffnung gegen die Peritonealhöhle abschliesst, zurückgelassen. Scheidentrichter beiderseits bis auf einen kleinen Spalt geschlossen.                                                         | 5. VI. 96 geheilt.                                                         | † 9. XII. 97 an Recidiv.                                                                                                            |
| c. cerv.              | 24. 2. 96. Totalexstirpation ohne besondere Schwierigkeit. Ovarien bleiben zurück. Tubenstümpfe mit Billrot'schen Klammern gefasst. Wunde in der Mitte offen; Jodoformgaze. Das Carc. durchsetzt die Cervixwand bis auf $\frac{1}{2}$ cm gesunden Gewebes.                                                                                                                       | 14. III. 96 geheilt entlassen.                                             | 30. VIII. 97 Recidiv. † 12. I. 98. Metastasen im Periton. u. in der Blase.                                                          |
| c. cerv.              | 26. III. 96. Auskratzung und Verschorfung der carcinomat. Massen. Alsdann Totalexstirpation in üblicher Weise ohne besondere Schwierigkeit. Ovarien bleiben zurück. In die Wunde Jodoformgaze.                                                                                                                                                                                   | 22. IV. 96 entlassen; wahrscheincl. besteht eine Uterinen-Scheiden-Fistel. | 11. VII. 96 Operation der Fistel, frühere Wunde sehr schön geheilt. † Nov. 96 an Recidiv, das bes. auf die Blase übergriffen hatte. |
| c. cerv.<br>corp. ut. | 4. V. Untersuchung in Narkose. Das Carcinom steht an der Grenze der Radikaloperation.<br>6. V. Totalexstirpation glatt und ohne Störung. Drainage der Wunde. Der aufgeschnittene Uterus erweist sich hoch bis in den Cervix carcinomatös entartet. Corpusschleimhaut zeigt ebenfalls carcinomatöse Wucherungen, derb und rauh. Im rechten Parametrium ebenfalls Krebszellnester. | † 8. V. 96. Croupöse Pneumonie. Sepsis.                                    | † infolge der Operation.                                                                                                            |

| Name,<br>Alter                  | Menses                                                                  | Geburten<br>nor-<br>male | Fehl-<br>geb. | Beschwerden. Dauer des Leidens<br>Etwaige vorherige Behandlung. Befund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67) Lo. M.<br>40 J. alt.        | Seit 14. Jahre<br>regelmässig.                                          | V                        | 1             | Seit 5 Monaten unregelmässige Men-<br>starker Ausfluss. 3mal starke P-<br>tungen.<br>J. U.: Ut. gut beweglich, glatte Schleim-<br>haut. Von der hinteren und vorderen<br>Muttermundslippe aus ragt in die Scheide<br>ein apfelgrosser, stark zerklüfteter,<br>leicht blutender, bröckeliger Tumor.<br>Parametrien frei, rechtes etwas ge-<br>spannt. Anhänge ohne Befund.                              |
| 68) Za. A.<br>58 J. alt.        | Seit 16. Jahre<br>regelmässig.<br>Menopause<br>mit 53 J.                | —                        | —             | Seit 9 Monaten unregelmässige P-<br>tungen; dazwischen Ausfluss. Sta-<br>Abmagerung.<br>Genitalbefund: Uterus retroponiert, be-<br>weglich. Portio zapfenförmig, etwas<br>nach vorn gerichtet.<br>Ovarien, Tuben, Parametrien ohne be-<br>sonderen Befund.<br>Auskratzung der Uterushöhle ergab<br>Carcinom.                                                                                           |
| 69) Zo. B.<br>62 J. alt.        | Seit 16. Jahre<br>regelmässig.<br>Menopause<br>mit 56 J.                | XI                       | —             | Seit 8—9 Monaten Blutungen.<br>J. U.: Uterus ziemlich klein, retroflo-<br>tiert, beweglich. Hintere Muttermund-<br>lippe stark vergrössert und verdickt<br>an ihrer Oberfläche ulceriert, leicht bl-<br>tend. Vordere Muttermundslippe nicht<br>zu fühlen.                                                                                                                                             |
| 70) Sto. M.<br>42 J. alt.       | Mit 16. J. auf-<br>getr.<br>Seit 20. Jahre<br>regelmässig.              | XIV                      | 1             | Seit einem halben Jahre Schmerzen<br>der Nabelgegend.<br>J. U.: Ut. vergrössert, normal gelegen,<br>ziemlich bewegl. Portio verdickt, knol-<br>lig aufgetrieben. Rechtes Parametrium<br>etwas verdickt und verkürzt.<br>Rechte Tube verdickt. Ovarien ohne<br>besonderen Befund.                                                                                                                       |
| 71) Schl.<br>Sof.<br>52 J. alt. | Menses stets<br>regelmässig<br>vom 18. J. an.<br>Menopause<br>mit 42 J. | IV                       | 1             | Seit einigen Monaten unregelmässige<br>Blutungen. Schmerzen in der rechten<br>Seite und im Kreuz.<br>J. U.: Uterus mässig beweglich. Hin-<br>tere und vordere Muttermundslippe ge-<br>bildet von einem apfelgrossen, stark<br>zerklüfteten, höckerigen, leicht blute-<br>nden Tumor. Parametrien dick, aber<br>nicht knollig infiltriert.<br>Tuben, Mutterbänder, Ovarien ohne be-<br>sonderen Befund. |

| Diagnose           | Operation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unmittelbarer Erfolg                                                                       | Weiterer Verlauf.        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| . port.            | 14. XII. Auskratzung und Verschorfung der carcinomatösen Massen.<br>Totalexstirpation in üblicher Weise mit Klemmen. Das rechte Parametrium muss direkt am Uterus abgetragen werden wegen seiner Verkürzung, sodass wohl etwas carcinomatöses Gewebe zurückgelassen werden muss. Mit dem Uterus werden beide Ovarien und Tuben vollständig entfernt. In die Wunde kommt Jodoformgaze. | 8. I. 97. Entlassung.<br>Rechts eine kleine Resistenz, wahrscheinlich beginnendes Recidiv. | † 2. XI. 97 an Recidiv.  |
| . corp.<br>ut.     | 15. I. 97. Totalexstirpation mit Klemmen glatt und ohne Störung. Anhänge links bleiben zurück. Jodoformgaze bis an die Spitze der Klemmen.<br>Am 4. Tag Abnahme der Klemmen.                                                                                                                                                                                                          | 5. II. 97. Scheidentrichter vollständig geschlossen. Geheilt entlassen.                    | 9. X. 97 † an Recidiv.   |
| . port.<br>ag.     | 6. II. 97. Zunächst Verschorfung des Carcinoms, dann Totalexstirpation mit Klemmen. Operation rasch und glatt; im ganzen waren nur 4 Klammern notwendig. In den Scheidentrichter Jodoformgaze.<br>Nach 48 Stunden Entfernung der Klemmen.                                                                                                                                             | 27. II. geheilt entlassen.                                                                 | 13. I. 98 recidivfrei.   |
| . cerv.            | 15. IV. 97. Totalexstirpation per vag. ohne besondere Schwierigkeit in üblicher Weise. In die kleine Scheidenwunde Jodoformgaze.                                                                                                                                                                                                                                                      | 5. V. 97 entlassen vollständig beschwerdefrei geheilt.                                     | 2. I. 98 recidivfrei.    |
| . eroid<br>Portio. | 3. V. 97. Zunächst Abkratzung und Verschorfung der Canceroidmassen. Beim Versuch per vag. die Parametrien abzubinden, kommt man zur Ueberzeugung, dass man der Neubildung zu nahe bleibt. Daher Laparotomie in Beckenhochlage. Parametrien möglichst weit nach aussen abgetragen. Durch die Scheide wird ein Jodoformgazestreifen von der Bauchhöhle aus durchgezogen.                | † 5. V. 97 an eitriger Peritonitis.                                                        | † infolge der Operation. |

| Name,<br>Alter                | Menses                                                       | Geburten<br>nor-<br>male | Fehl-<br>geb. | Beschwerden. Dauer des Leidens.<br>Etwaige vorherige Behandlung Befund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72) Ru. E.<br>61 J. alt.      | Menopause<br>seit einigen<br>Jahren.                         | unbekannt.               |               | Blutungen seit 1 Jahr.<br>Befund: Aus dem Cervikalkanal las-<br>sich carcinomatöse Bröckel entfer-<br>nen. Ut. ziemlich klein, mässig beweglich.<br>Parametrien verdächtig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 73) Schr.<br>M.<br>58 J. alt. | Seit 18. Jahre<br>regelmässig<br>seit 5 Monaten<br>unregelm. | X                        | 1             | Blutung und Ausfluss seit 3 Monaten<br>ohne Schmerzen.<br>J. U.: In die Scheide ragt ein erbsen-<br>apfelgrosser Tumor mit stark zerklüfteter,<br>bei der Berührung leicht blutender<br>Oberfläche. Dieser Tumor entspringt<br>der vordern und hintern Muttermund-<br>lippe.<br>Anhänge ohne besonderen Befund.<br>Untersuchung in Narkose: Uterus etwas<br>vergrössert, beweglich, links ein un-<br>gefähr apfelgrosses, sehr hartes Myom.<br>Probecurettement. Untersuchung ergibt<br>Carcinom. |
| 74) Ro. A.<br>48 J. alt.      | unbekannt.<br>(fehlt in der Anamnese.)                       |                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 75) Do. K.<br>46 J. alt.      | Seit dem 19. J.<br>ziemlich<br>regelmässig.                  | V                        | —             | Seit 3 Monaten in poliklinischer Behandlung<br>wegen Schmerzen im Unterbaue.<br>J. U.: Portio nach vorn gerichtet, klein,<br>hart, ziemlich verdickt. Oberfläche run-<br>del. Uterus vergrössert, retrovertiert, lei-<br>cht aufrichtbar, beweglich.<br>Anhänge ohne besonderen Befund.<br>Untersuchung excidierter Stückchen ergibt:<br>Carcinom.                                                                                                                                                |
| 76) We. M.<br>54 J. alt.      | Seit dem 18. J.<br>ziemlich<br>regelmässig.                  | XIII.                    | 3             | Seit 3 Wochen Abgang von blutigem<br>Schleim.<br>J. U.: Uterus normal gelegen, gut be-<br>weglich, ziemlich klein. Aeusserer<br>Muttermund geöffnet. In demselben<br>kommt man auf eine ringsum run-<br>del Fläche, welche leicht blutet. Es lässt<br>sich kleine Stückchen abbröckeln. Links<br>und hinten vom Uterus fühlt man Verdickungen.<br>Tuben, Mutterbänder, Ovarien ohne<br>sonderen Befund.                                                                                           |

| nose           | Operation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unmittelbarer Erfolg                           | Weiterer Verlauf.                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| port.<br>teri. | 1. V. 97. Totalexstirpation in typischer Weise. Auffindung des Douglas macht grosse Schwierigkeiten. Es wird endlich auf eine verschiebbliche Partie eingesehnen, es zeigt sich aber, dass das Rectum eröffnet ist. Sofortige Vernähung desselben. Ovarien bleiben zurück. In die kleine Wunde Jodoformgaze.                                                                                                                                                                | † 6. V. 97. Eitrig-fibrinöse Peritonitis.      | † infolge der Operation.                                                |
| roid<br>ortio. | 5. V. 97. Totalexstirpation. Zuvor Verschorfung des Carcinoms. Abbindung der Parametrien weit vom Uterus gelingt leicht. Scheidentrichter bis auf ein kleines Loch geschlossen. Jodoformgaze.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25. V. 87 geheilt entlassen.                   | 8. IX. 97 Recidiv.<br>22. IX. 97 †.                                     |
| corp.<br>yoma  | 24. VI. 97. Zunächst Entfernung eines ca. 5 Pfennigstück grossen carcinomatösen Ulcus der hintern Scheidenwand in der Nähe des Frenulums. Totalexstirpation per vag. begonnen, wird aber, da sich der Uterus absolut nicht tiefer ziehen lässt, jedenfalls wegen des Myoms, per laparotomiam beendigt. Uterus sehr brüchig, reisst ein beim Emporziehen. Es ergiesst sich Jauche in die Bauchhöhle. Das Myom ist ganz verkalkt. Nach der Scheide zu Jodoformgaze eingelegt. | 20. VII. 97 geheilt entlassen.                 | 24. IX. 97. Carcinom der Vulva. Exstirpation. 15. XII. 97. Recidivfrei. |
| cerv.          | 3. VII. 97. Totalexstirpation mit Klemmen. Im Anfang glatt und ohne Störung. Wegen Blutung sind 14 Klemmen nötig. Kräftige Tamponade. Nach 48 Stunden Entfernung der Klemmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22. VII. entlassen. Uebelriechen der Ausfluss. | 14. XII. 97. Pat. stellt sich vor, wird als recidivfrei befunden.       |
| cerv.          | 6. VII. 97. Totalexstirpation gelingt leicht. Nichts besonderes. Scheidentrichter in der Mitte offen, Jodoformgaze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25. VII. geheilt entlassen.                    | 13. XII. 97 recidivfrei.                                                |

| Name<br>Alter                   | Menses                                                                  | Geburten<br>nor-<br>male | Fehl-<br>geb. | Beschwerden. Dauer des Leidens.<br>Etwaige vorherige Behandlung. Befund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77) Ma. K.<br>46 J. alt.        | Seit 17. J.<br>regelmässig<br>Seit 4 Mon.<br>bleiben die<br>Menses aus. | V                        | 2             | Blutung nach der Cohabitation. Pat. kommt auf Veranlassung des Arztes zu J. U.: Ut. etwas vergrössert, anteflectiert, normal beweglich. Kleine Erosion. In der vordern Muttermundslippe ca. haselnussgrosser, derber Knoten. Oberfläche etwas ulceriert, speckig. Blutet leicht, bei der Berührung blutend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 78) Ob. M.<br>38 J. alt.        | Menses bestehen seit dem 16. J., immer unregelm.                        | II                       | —             | Der behandelnde Arzt, welcher bei d. Pat. ein kleines Gewächs entfernt haben soll, schickt dieselbe in die Klinik. J. U.: Ut. normal beweglich, anteflectiert, etwas vergrössert. Portio stark kolbig aufgetrieben; hauptsächlich nach links. Oberfläche rauh, nicht blutend. Anhänge ohne besonderen Befund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 79) Sto. E.<br>49 J. alt.       | Seit dem 14. J.<br>regelmässig.                                         | IX                       | —             | Seit ungefähr 10 Mon. ausserordentlich profuse Menses, 14 Tage bis 3 Wochen dauernd. Ihr Arzt schickt sie in die Klinik. Portio gross, plump, hart mit engem unregelmässig gestaltetem Muttermund. Cervix verdickt und hart. Ut. vergrössert und hart, retrovertiert, gut beweglich. Sonde (8½ cm) findet in der Uterushöhle starke, derbe Rauheit, die bei der Berührung ziemlich stark bluten. Oberfläche des Ut. vollkommen glatt. In der Basis des linken lig. lat. ein kleiner, derber, straffer Stränge.                                                                                                                   |
| 80) Ueb.<br>Barb.<br>39 J. alt. | Seit dem 15. J.<br>regelmässig.                                         | —                        | —             | Seit 6 Wochen andauernd Blutabgang. Keine Schmerzen. J. U.: Auf der Portio von der linken und hintern Begrenzung des Muttermunds ausgehend ein hühnereigrosser, an der Oberfläche stark zerfallender, leicht blutender Tumor, der stark in die Scheide vorspringt, sodass die vordere Muttermundslippe fast ganz verdeckt wird. Cervix hart, verdickt. Ut. retroflectiert, lässt sich nicht aufrichten. Rechtes Lig. lat. straff, verkürzt, keine Anschwellungen. Linkes lig. lat. straff; seitlich vor spina ischii derber Knoten, kaum beweglich. Tuben und Ovarien dieser Seite wenig beweglich, scheinen verwachsen zu sein. |

| Diagnose     | Operation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unmittelbarer Erfolg                              | Weiterer Verlauf.                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| e. cerv.     | 14. VII. 97. Totalexstirpation mit Klemmen in üblicher Weise und ohne besondere Schwierigkeit.<br>Nach 3 Tagen Entfernung der Klemmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. VIII. 97. Entlassung geheilt.                  | 13. XII. 97. Recidivfrei.                                      |
| e. cerv.     | 8. VII. Totalexstirpation mit 6 Klemmen; bietet keine Schwierigkeit. Tamponade und Polsterung mit Jodoformgaze.<br>10. VII. Entfernung der Klemmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28. VII. Entlassung geheilt.                      | 13. XII. 97. Pat.stellt sich vor. Es wird Recidiv konstatiert. |
| e. corp.     | 28. VII. Totalexstirpation macht ziemliche Schwierigkeiten wegen der erwähnten derben Stränge. Uterus mit Adnexen entfernt.<br>Scheidenwunde geschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17. VIII. Wunde tadellos geheilt, entlassen.      | 17. XII. 97. Recidivfrei.                                      |
| e. port. ag. | Operation beschlossen, weil die Veränderungen am 1. lig. nicht sicher als carcinomatös erscheinen.<br>14. VIII. 97. Totalexstirpation. Zunächst nach üblicher Vorbereitung tiefe Scheiden-Dammincision links. Eröffnung des Douglas schwierig wegen zahlreicher intraperitonealer Adhäsionen.<br>Abbindung der Parametrien mit Klemmen möglichst weit entfernt. Der erwähnte Knoten lässt sich nicht entfernen.<br>Scheiden- und Peritonealwunde abgeschlossen. | 5. IX. 97. Pat.fühlt sich wohl u. wird entlassen. | 14. XII. 97. Recidiv. Abermalige Aufnahme.                     |

| Name,<br>Alter                  | Menses                         | Geburten<br>nor-<br>male | Fehl-<br>geb. | Beschwerden. Dauer des Leidens<br>Etwaige vorherige Behandlung. Befund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81) Hei.<br>Marg.<br>34 J. alt. | Seit 16. Jahre<br>regelmässig. | VI                       | —             | Seit 5 Mon. unregelmässige Blutung.<br>J. U.: Portio stark verdickt, um 3-<br>Dreifache vergrössert. Saum des Mut-<br>termundes unregelmässig gestaltet durch<br>eine harte, aus dem Cervikalkanal her-<br>auswachsende Neubildung. Cervix<br>das Dreifache verdickt, Uteruskörper<br>vergrössert und hart, schwer beweglich.<br>An Stelle des Cervikalkanals eine weite,<br>starkwandige Höhle mit zerfallenen<br>Wandungen, die teilweise von lei-<br>abbröckelnden Teilen der Neubildung<br>bedeckt sind. Die beiden Parametrien<br>sehr straff. Nach links hin erscheint<br>die Neubildung die Wand des Cervix<br>bereits überschritten zu haben, dessen<br>hintere Wand auch sehr stark verkürzt<br>ist. Knollige Verdickungen in den Pa-<br>rametrien nicht nachweisbar. |
| 82) Ber. A.<br>62 J. alt.       | Bis zum 53. J.<br>regelmässig. | XI                       | —             | Seit 10 Wochen Abgang von Blut und<br>Wasser.<br>J. U.: An Stelle der Portio eine zer-<br>fallene Neubildung mit scharfen in-<br>fibrierten Rändern, die nach linkshin auf<br>das Scheidengewölbe übergreift. Cervix<br>verdickt, Aussenfläche glatt. Corpus<br>gut beweglich. Tuben und Ovarien ohne<br>path. Befund. Rechtes Parametrium<br>dünn, zart, gut dehnbar; linkes unmit-<br>telbar am Abgang vom Ut. leicht ver-<br>dickt, im übrigen straff, hart und etwas<br>verkürzt. Keine knolligen Verdickungen.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 83) Woe.<br>Bh.<br>43 J. alt.   | Seit 16. Jahre<br>regelmässig. | IX                       | —             | Seit nahezu 1 Jahr starke Blutung; von<br>Arzt mit Tropfen behandelt.<br>J. U.: An Stelle der Portio ein in der<br>Ganzen rundlicher Tumor von der Grösse<br>eines Borstorfer Apfels; ziemlich derb<br>Konsistenz, an der Oberfläche vielfach<br>zerfallen, leicht blutend. Die Neubildung<br>greift ringsum mit scharfer Grenze<br>auf das Gewebe der Portio über, lässt<br>jedoch allenthalben das Scheidengewölbe<br>völlig frei. Cervix stark verdickt und<br>hart. Corpus anteflectiert, mässig gut<br>beweglich.                                                                                                                                                                                                                                                         |

| nose  | Operation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unmittelbarer Erfolg                               | Weiterer Verlauf.                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| cerv. | <p>16. VIII. 97.</p> <p>Wegen der Grösse und schweren Beweglichkeit des Ut. und anderer im Befund angegebenen Schwierigkeiten wird die abdominale Exstirpation ausgeführt. Dieselbe macht aber auch noch ziemliche Schwierigkeiten. Neubildung geht hinten und vorn bis ans Peritoneum heran. Abbindung auf beiden Seiten möglichst weit vom Uterus. Bauchwunde durch tiefgreifende Silberdrähte geschlossen.</p> | <p>3. IX. entlassen mit völligem Wohlbefinden.</p> | <p>18. XII. 97. Recidivfrei.</p> |
| cerv. | <p>27. VIII. Totalexstirpation per vag. nicht ohne Schwierigkeit. Peritoneum und Scheidenwunde mit Catgutnähten abgeschlossen. Scheide mit Jodoformgaze tamponiert.</p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p>15. IX. geheilt entlassen.</p>                  | <p>5. I. 98. Recidivfrei.</p>    |
| cerv. | <p>2. XII. 97. Totalexstirpation per vag. in üblicher Weise ohne Störung. Schluss der Wunde mit Catgutnaht.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>28. XII. entlassen. Abgang von Urin.</p>        | <p>Bis jetzt recidivfrei.</p>    |

**Tabelle II. (a.)**  
Carcinoma portionis.

| Zeitraum der Operation<br>Zahl<br>und Form des Carcinoms | † im<br>An-<br>schluss<br>an die<br>Operat. | Ver-<br>schol-<br>len | † an<br>andern<br>Krank-<br>heiten | Reci-<br>div | † an<br>Reci-<br>div | 71<br>72<br>ge |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| Summa 0                                                  |                                             |                       |                                    |              |                      |                |
| 1. I. 87 bis 31. XII. 87                                 | —                                           | —                     | —                                  | —            | —                    |                |
| Summa 2                                                  |                                             |                       |                                    |              |                      |                |
| 1. I. 88 bis 31. XII. 88                                 | 1                                           | —                     | —                                  | —            | 1                    |                |
| Summa 6                                                  |                                             |                       |                                    |              |                      |                |
| 1. I. 89 bis 31. XII. 89                                 | 1                                           | —                     | —                                  | —            | 3                    |                |
| Summa 4                                                  |                                             |                       |                                    |              |                      |                |
| 1. I. 90 bis 31. XII. 90                                 | —                                           | —                     | 2                                  | —            | 2                    |                |
| Summa 0                                                  |                                             |                       |                                    |              |                      |                |
| 1. I. 91 bis 31. XII. 91                                 | —                                           | —                     | —                                  | —            | —                    |                |
| Summa 4                                                  |                                             |                       |                                    |              |                      |                |
| 1. I. 92 bis 31. XII. 92                                 | 1                                           | —                     | —                                  | —            | 1                    |                |
| Summa 5                                                  |                                             |                       |                                    |              |                      |                |
| 1. I. 93 bis 31. XII. 93                                 | 2                                           | —                     | 1                                  | 1            | —                    |                |
| Summa 3                                                  |                                             |                       |                                    |              |                      |                |
| 1. I. 94 bis 31. XII. 94                                 | —                                           | —                     | —                                  | 1            | —                    |                |
| Summa 1                                                  |                                             |                       |                                    |              |                      |                |
| 1. I. 95 bis 31. XII. 95                                 | 1                                           | —                     | —                                  | —            | —                    |                |
| Summa 2                                                  |                                             |                       |                                    |              |                      |                |
| 1. I. 96 bis 31. XII. 96                                 | —                                           | —                     | —                                  | —            | 2                    |                |
| Summa 5                                                  |                                             |                       |                                    |              |                      |                |
| 1. I. 97 bis 31. XII. 97                                 | 1                                           | —                     | —                                  | 1            | 1                    |                |

## Tabelle II. (b.)

Carcinoma cervicis.

| Ort und Form der Operation<br>Zahl | † im<br>An-<br>schluss<br>an die<br>Operat. | Ver-<br>schol-<br>len | † an<br>andern<br>Krank-<br>heiten | Reci-<br>div | † an<br>Reci-<br>div | Zur<br>Zeit<br>gesund |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| Summa 0                            |                                             |                       |                                    |              |                      |                       |
| 87 bis 31. XII. 87                 | —                                           | —                     | —                                  | —            | —                    | —                     |
| Summa 1                            |                                             |                       |                                    |              |                      |                       |
| 88 bis 31. XII. 88                 | 1                                           | —                     | —                                  | —            | —                    | —                     |
| Summa 0                            |                                             |                       |                                    |              |                      |                       |
| 89 bis 31. XII. 89                 | —                                           | —                     | —                                  | —            | —                    | —                     |
| Summa 1                            |                                             |                       |                                    |              |                      |                       |
| 90 bis 31. XII. 90                 | —                                           | —                     | —                                  | —            | 1                    | —                     |
| Summa 5                            |                                             |                       |                                    |              |                      |                       |
| 91 bis 31. XII. 91                 | 1                                           | 1                     | —                                  | —            | 2                    | 1                     |
| Summa 2                            |                                             |                       |                                    |              |                      |                       |
| 92 bis 31. XII. 92                 | —                                           | —                     | —                                  | —            | 2                    | —                     |
| Summa 3                            |                                             |                       |                                    |              |                      |                       |
| 93 bis 31. XII. 93                 | —                                           | —                     | 1                                  | —            | 1                    | 1                     |
| Summa 5                            |                                             |                       |                                    |              |                      |                       |
| 94 bis 31. XII. 94                 | —                                           | 1                     | —                                  | —            | 1                    | 3                     |
| Summa 3                            |                                             |                       |                                    |              |                      |                       |
| 95 bis 31. XII. 95                 | —                                           | 1                     | —                                  | —            | —                    | 2                     |
| Summa 2                            |                                             |                       |                                    |              |                      |                       |
| 96 bis 31. XII. 96                 | —                                           | —                     | —                                  | —            | 2                    | —                     |
| Summa 8                            |                                             |                       |                                    |              |                      |                       |
| 97 bis 31. XII. 97                 | —                                           | —                     | —                                  | —            | —                    | 8                     |
| Carc. port. et cerv.               |                                             |                       |                                    |              | 1                    |                       |

Die primären Resultate der 63 Totalexstirpationen bei Columkarcinom weisen eine Mortalität von 9 Fällen oder 14,2 % auf. 5 Todesfälle erfolgten an Infektion (Peritonitis); darunter ist ein Fall, bei dem nachträglich wegen Blutung die Laparotomie ausgeführt wurde. 4 Todesfälle waren durch Shock und Blutung verursacht.

Auf die einzelnen Carcinom-Formen verteilen sich die Todesfälle derart, dass die reinen Portiokarcinome mit 7 oder 11,1 %, die reinen Cervixkarcinome mit 2 oder 3,1 % letaler Ausgänge beteiligt sind.

Verschollen sind 2, gestorben an andern Krankheiten oder unbekannter Ursache 4 Frauen.

Was die sogenannten Dauerresultate anlangt, so bekamen Rezidiv im 1. Jahr von 54 Fällen 19 oder 35,1 %; im 2. Jahr von 25 Fällen 3 oder 12 %; im 3. Jahr von 22 Fällen 1 oder 4,5 %. Nach dem 3. Jahr wurden keine Rezidive mehr beobachtet. Im ganzen wurden von 48 in Betracht kommenden Fällen 23 oder 47,8 % rückfällig.

Rezidivfrei waren nach Ablauf des 1. Jahres von 35 Fällen: 27 oder 77,1 %.

Nach 2 Jahren waren noch rezidivfrei 15

|   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|----|
| " | 3 | " | " | " | " | 12 |
| " | 4 | " | " | " | " | 6  |
| " | 5 | " | " | " | " | 5  |
| " | 6 | " | " | " | " | 3  |
| " | 7 | " | " | " | " | 2  |
| " | 8 | " | " | " | " | 2. |

Im ganzen sind bis heute rezidivfrei, eingerechnet die Fälle von 1897, 23 oder 40,3 %.

Wegen Corpuskarcinom wurde 16 mal die vaginale Total-exstirpation vorgenommen, 4 mal die abdominale so dass im Ganzen 20 Radikaloperationen bei Carcinoma corperis ausgeführt wurden.

### Tabelle III.

Carcinoma corporis.

| Zeitraum der Operation<br>Zahl<br>und Form des Carcinoms | † im<br>An-<br>schluss<br>an die<br>Operat. | Ver-<br>schol-<br>len | † an<br>andern<br>Krank-<br>heiten | Reci-<br>div | † an<br>Reci-<br>div | Zur<br>Zeit<br>gesund |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| Summa 2                                                  |                                             |                       |                                    |              |                      |                       |
| 1. I. 87 bis 31. XII. 87                                 | —                                           | —                     | 1                                  | —            | —                    | 1                     |
| Summe 1                                                  |                                             |                       |                                    |              |                      |                       |
| 1. I. 88 bis 31. XII. 88                                 | —                                           | 1                     | —                                  | —            | —                    | —                     |
| Summa 0                                                  |                                             |                       |                                    |              |                      |                       |
| 1. I. 89 bis 31. XII. 89                                 | —                                           | —                     | —                                  | —            | —                    | —                     |
| Summa 1                                                  |                                             |                       |                                    |              |                      |                       |
| 1. I. 90 bis 31. XII. 90                                 | —                                           | —                     | —                                  | —            | 1                    | —                     |
| Summa 4                                                  |                                             |                       |                                    |              |                      |                       |
| 1. I. 91 bis 31. XII. 91                                 | 2                                           | —                     | 1                                  | —            | —                    | 1                     |
| Summa 2                                                  |                                             |                       |                                    |              |                      |                       |
| 1. I. 92 bis 31. XII. 92                                 | —                                           | —                     | —                                  | —            | 1                    | 1                     |
| Summa 1                                                  |                                             |                       |                                    |              |                      |                       |
| 1. I. 93 bis 31. XII. 93                                 | —                                           | 1                     | —                                  | —            | —                    | —                     |
| Summa 2                                                  |                                             |                       |                                    |              |                      |                       |
| 1. I. 94 bis 31. XII. 94                                 | 2                                           | —                     | —                                  | —            | —                    | —                     |
| Summa 2                                                  |                                             |                       |                                    |              |                      |                       |
| 1. I. 95 bis 31. XII. 95                                 | —                                           | —                     | —                                  | —            | —                    | 2                     |
| Summa 2                                                  |                                             |                       |                                    |              |                      |                       |
| 1. I. 96 bis 31. XII. 96                                 | 1                                           | —                     | —                                  | —            | —                    | 1                     |
| Summa 3                                                  |                                             |                       |                                    |              |                      |                       |
| 1. I. 97 bis 31. XII. 97                                 | 1                                           | —                     | —                                  | —            | 1                    | 1                     |

An den Folgen der Operation starben 6 Frauen, darunter die 4, bei welchen die Laparotomie gemacht wurde, an Peritonitis. Nach Abzug der Verschollenen und der an anderen Krankheiten Gestorbenen kommen nur noch 11 in Betracht.

Im 1. Jahr wurden rückfällig 1 oder 9,9 %. Im ganzen wurden rückfällig 4 oder 36,3 %.

Die Prozentzahlen der Heilung sind nach Ablauf des 1. Jahres von 10 in Betracht kommenden Fällen 10 oder 100 %.

Nach Ablauf des 2. Jahres von 10 Fällen 7 oder 70 %.

Nach 3 Jahren waren noch rezidivfrei 4

|   |    |   |   |   |   |   |
|---|----|---|---|---|---|---|
| " | 4  | " | " | " | " | 3 |
| " | 5  | " | " | " | " | 2 |
| " | 6  | " | " | " | " | 2 |
| " | 7  | " | " | " | " | 1 |
| " | 8  | " | " | " | " | 1 |
| " | 9  | " | " | " | " | 1 |
| " | 10 | " | " | " | " | 1 |

Gegenwärtiges Heilungsergebnis: Im ganzen sind noch rezidivfrei 7 oder 43,7 %.

Nehmen wir Collum- und Corpuskarzinome zusammen, so sind im Ganzen noch rezidivfrei 30 oder 40,1 % (nach Abzug der Verschollenen.) Dabei sind jedoch auch die Fälle vom Jahr 97 mitgerechnet, bei welchen seit dem Zeitpunkt der Operation meist noch kein ganzes Jahr verflossen ist.

Um ein klares Bild zu gewinnen über den Verlauf der Fälle, die länger als ein Jahr rezidivfrei blieben, lassen wir eine Rezidivtabelle folgen. Auch hier sind die zuletzt Operierten mit aufgeführt.

### Recidivtabelle (IV.)

[illegible]

Aus unserer Zusammenstellung ersehen wir, dass im Ganzen 15 oder 18,7 % aller Fälle im Anschluss an die Operation starben. Als Todesursachen sind auch hier zu bezeichnen die 2 Hauptgefahren: Infektion und Blutung.

Winter schreibt in seinem Aufsatz: „Ueber die Schrödersche supravaginale Amputation bei Portiokarcinom“:

Eine lebenssichere Operation wird die Totalexstirpation ebenso wenig, vielleicht noch weniger als die Ovariectomie. Zuweilen werden Todesfälle durch Infektion nicht ausbleiben; jauchende Karcinommassen und Pyometra erleichtern das Zustandekommen. Ureterenunterbindung kommt ebenfalls vor. Reichel hat uns im Ileus, welcher durch Verlötung von Darmschlingen im Douglas entsteht, eine neue Gefahr der Totalexstirpation kennen gelehrt. Solche Todesfälle werden nicht ausbleiben und von Zeit zu Zeit wird vor allem die infektiöse Peritonitis noch Opfer fordern.

Aus der Statistik ergibt sich weiter, dass entschieden die meisten Rezidive, 21 oder 35,6 %, im 1. Jahr auftraten, dass sie dann von Jahr zu Jahr seltener werden und dass nach dem 5. Jahr überhaupt kein Rückfall mehr beobachtet wurde.

Im Anfang sprach man die 2 volle Jahre vom Rezidiv Verschonten als endgültig geheilt an; man war aber genötigt, mit längerer Beobachtung den Termin weiter hinauszurücken. Jetzt ist man dahin gelangt, die 5 Jahre Freibleibenden als geheilt anzusehen. Dieser Termin dürfte denn auch nach den Ergebnissen der dauernden Kontrolle der Operierten genügend weit gesetzt erscheinen. In diesem Sinne dürfte unsre Statistik in gewissem Grade als Bestätigung der gefundenen Thatsache gelten.

Allein herzlich wenig sind es, welche diesen fernen Zeitpunkt andauernder Heilung erreichen. Aus allen Statistiken lässt sich erkennen, dass kaum 30 % der Operierten 5 Jahre gesund bleiben, dass überhaupt noch keine 10 % aller an Gebärmutterkrebs leidenden Frauen einer radikalen Heilung teilhaftig werden.

Wenn nun auch die Erfolge keine glänzenden sind, wenn auch nach 2 Jahren beinahe die Hälfte der Operierten dem tückischen Rückfall verfällt, so haben wir doch nicht im Mindesten die Berechtigung hier pessimistische Ansichten Platz greifen zu lassen, zu behaupten, man habe den Kranken durch die Operation nichts genützt. Die Kunst des Arztes besteht nicht nur darin, den kranken Menschen vollständig und dauernd zu heilen, sondern auch darin, ihm das Leben zu verlängern und ihm seine Qual und Beschwerden zu erleichtern. Den Operierten ist doch mit wenigen Ausnahmen Monate, selbst Jahre lang das Bewusstsein der wieder erlangten Gesundheit geschenkt. Ausserdem ist es eine unzweifelhafte Thatsache, dass der grossen Mehrzahl der Patientinnen, auch wenn sie nachher an Rezidiv erkranken, der Rest ihres Lebens erheblich erleichtert wird.

Olshausen schreibt hierüber in seinen klinischen Beiträgen zur Gynäkologie und Geburtshilfe: „Auf die Operation folgt fast stets ein beschwerdefreies längeres Stadium, während vorher Blutungen, Ausflüsse und Schmerzen die Kranken quälten. Kommt aber das Rezidiv, das meist ausserhalb der verschlossenen Vagina als Infektionsrezidiv erfolgt, so treten dann wohl etwas blutwässerige Absonderungen auf, aber selten jene furchtbar stinkenden Ausflüsse, wie sie dem zerfallenen Karcinom eigen sind. Besonders scheinen auch die Schmerzen ungleich unerheblicher zu sein und für lange Zeit zu bleiben.“

Die Klage über den verhältnismässig geringen Erfolg bei der heutigen Operationstechnik wird zum Teil hinfällig und die Sache erscheint in ganz anderem Lichte, wenn man bedenkt, dass im Durchschnitt 70 Prozent aller dieser Kranken inoperabel zur ersten Untersuchung kommen und dass von den übrigen 30 % ein gut Teil keine reinen Fälle vorstellt, insoferne bei ihnen durch die Untersuchung und die Operation zur Evidenz festgestellt wurde, dass der Krebs die Grenzen des Uterus bereits überschritten hatte bzw. so nahe der Exstirpationslinie gekommen war, dass von einem Operieren im Gesunden gar nicht die Rede sein konnte.

Dass die meisten Karzinome zu spät zur Operation kommen, ist eine zweifellos feststehende Thatsache und man fragt sich: Woher kommt das?

Die Hauptschuld liegt entschieden an den Kranken selbst, ein Teil derselben aber auch an der falschen Behandlung, an der zu spät gestellten oder verfehlten Diagnose.

Bei den meisten Frauen sind Unkenntnis, Nachlässigkeit oder falsche Belehrung durch andere die Gründe, welche sie abhalten, einen Arzt zu befragen. Die im Anfang geringe Blutung wird nicht beobachtet; die Frauen bei denen schon längst Menopause besteht, glauben, ihre Periode sei wieder eingetreten.

Insbesondere trifft dieses zu für das Material der hiesigen Klinik, die fast ausschliesslich durch Frauen vom Land und zwar aus den niedersten Klassen der Bevölkerung frequentiert wird. Da wird schon aus pekuniären Rücksichten die Befragung des Arztes möglichst weit hinausgeschoben, in der Hoffnung, das Leiden vergehe wieder von selbst. Es ist klar, dass dem gegenüber das Material der Kliniken in grösseren Städten ungemein viel günstiger ist bezüglich initialer Fälle.

Interessante Beobachtungen über die Zeitdauer vom Auftreten der ersten Symptome bis zum Befragen des Arztes von seiten der Kranken hat Thorn angestellt. Von 226 Kranken suchten 23 gleich nach den ersten Symptomen ärztliche Beratung, 13 liessen einen Monat vergehen, 29 zwei Monate, 41 drei, 25 vier, 13 fünf, 27 sechs, 9 sieben, 12 acht, 8 neun, 2 zehn, 2 elf, 11 zwölf Monate und 11 Kranke warteten über 1 Jahr, ehe sie sich zum ersten Gang zum Arzt bequemen. Diese Zahlen reden mehr als alles andere von der unglaublichen Sorglosigkeit und Nachlässigkeit der Krebskranken.

Angesichts dieser betrübenden Thatsache, drängt sich uns die weitere Frage auf, ob sich denn die Prognose noch besser wird gestalten können. Inwiefern diese Frage zu beantworten ist, wollen wir am Schlusse dieser Arbeit noch erörtern.

Der Beweis von der endgiltigen Heilbarkeit des auf den Uterus völlig beschränkten Karzinoms ist erbracht und durch unsere Statistik vollauf bestätigt. Die moderne Gynäkologie verfügt über Operationsmethoden, die allen reinen Fällen gerecht werden. Es ist jedoch nötig, auf den bisher betretenen Bahnen fortzuschreiten und weiter zu arbeiten, um die oben erwähnten Misstände zu beseitigen und günstigere Verhältnisse herbeizuführen. Auf welche Weise dies Ziel zu erreichen wäre, darüber äussert sich Thorn am Ende seines Aufsatzes: „Statistisches und Klinisches zum Karcinoma uteri“: Alles Heil ist auch hiefort nicht von riskanten Operationen, sondern allein von der frühzeitigsten Diagnose zu erwarten. Was an Hilfsmitteln dazu nötig ist, gibt die heutige Schule jedem Arzt in völlig ausreichendem Maße in die Praxis mit. Macht ein jeder in seinem Kreise vollen Gebrauch davon und lässt er es sich besonders angelegen sein, den Kampf gegen alte Vorurteile, Unwissenheit und Nachlässigkeit seiner Schutzbefohlenen energisch durchzuführen, namentlich in den kritischen Jahren jede Gelegenheit zur Aufklärung und Mahnung zu benutzen und auch da, wo scheinbar kein Symptom, keine Klage der Hilfesuchenden auf ein Leiden der Genitalsphäre hindeutet, wo aber doch die entfernte Möglichkeit eines solchen nicht von der Hand zu weisen ist, sich volle Klarheit zu verschaffen, so wird der Erfolg eines solch' sorgsamen Waltens seines Amtes nicht ausbleiben und sein Verdienst wird kein geringeres sein, als das des Operateurs, der Dank seiner Hilfe den früh erkannten Krebs ausrottet. Wie viel Segen ruht in solcher Thätigkeit des Hausarztes bei einem Leiden, das an Grausamkeit alle andern übertrifft. Auch die Prognose des Gebärmutterkrebses liegt, um einen bekannten Ausspruch Richard v. Volkmann's zu übertragen, in der Hand der Hausärzte. Möchte es ihnen gelingen, sie immer günstiger zu gestalten und möge ihre Mitarbeit der operativen Gynäkologie, die vorläufig an der Grenze des Erreichbaren angelangt zu sein scheint, zu neuen Lorbeeren verhelfen.

---

## Litteraturverzeichnis:

Schmidt, Diss., Erlangen 1894.

Schaller, Diss., Berlin 1890—91.

Münch. med. Wochenschrift. Jahrgang 44. No. 45, 46, 47. Thorn:

Statistisches und Klinisches zum Carcinoma uteri.

Archiv für Gynäkologie. 1892. Rich. Kruckenberg: Resultate  
der operat. Behandlung des Carcinoms und Sarcoms der  
Gebärmutter, speciell der vaginal. Totalexstirpation des  
Uterus.